

Traitement post-opératoire intervention LASIK

À LA MAISON

- Pendant les premières heures suivant l'intervention, nous vous recommandons de **vous reposer les yeux fermés** ou de dormir.
- Pendant les **3 premières nuits**, vous devez porter des **lunettes de protection** ; elles vous seront fournies.
- **Évitez de vous frotter** les yeux.
- Commencez à **mettre des gouttes** dès l'arrivée à la maison.
- Vous **pouvez vous déplacer normalement**. Les sports légers (gym) peuvent être repris après 1 semaine.
- Les efforts intenses, ainsi que les sports de contact, la natation (portez des lunettes de natation) et le sauna doivent être évités pendant 1 mois.
- **Ne vous maquillez pas** pendant les 2 premières semaines.
- En cas de douleur dans les 24 heures suivant l'opération, vous pouvez prendre 1 comprimé de Dafalgan (500 mg) toutes les 6 heures.

CALENDRIER GOUTTES OPHTALMIQUES

Trafloxal Edo gtt :	3 x par jour pendant 1 semaine
Dexaméthasone Edo gtt :	6 x par jour pendant les 3 premiers jours 4 x par jour pendant 2 semaines
Larmes artificielles :	toutes les 2 heures la première semaine, puis fréquemment (par exemple Thealoz, Hylogel, Systane, etc.)

Pour plus d'explications sur l'utilisation des gouttes ophtalmiques, consultez la brochure sur www.uzleuven.be/brochure/700730 (en néerlandais).

EN CAS DE PROBLÈME OU POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

- Vous pouvez appeler le standard téléphonique pendant la journée au 016 33 23 70. Ils pourront ainsi vous mettre en communication avec l'ophtalmologiste.
- À partir de 18 heures et le week-end, vous pouvez contacter l'ophtalmologue de garde, joignable via le standard au 016 33 22 11.