



Le séjour de votre enfant au service d'hémato-oncologie pédiatrique

Information pour les patients

INTRODUCTION	3
DIRECTIVES GÉNÉRALES	5
• La prise de médicaments	
• Soins de la bouche	
• Fièvre	
• Constipation	
• Douleur	
• Hémogramme	
• Contact avec l'urine et les selles	
• Sommeil	
• Autre directives	
DIRECTIVES POUR LA PRÉVENTION DES INFECTIONS	14
• Règles de vie	
• Règles à suivre pour aider à prévenir les infections	
• Signes pouvant indiquer la présence d'une infection	
DIRECTIVES CONCERNANT L'ALIMENTATION	20
CONTACT	21
QUESTIONS OU REMARQUES	22

Être confronté à une affection grave chez un enfant est une situation qui soulève une foule de questions. Au service d'hématologie pédiatrique, l'équipe tout entière est là pour répondre à ces multiples questions, d'ordre pratique ou autre. Nous faisons le maximum pour apporter à votre enfant et à vous-même tout le soutien et l'accompagnement possibles.

Chaque jour, les médecins-assistants font leur ronde avec le médecin superviseur. Les médecins, de même que le personnel infirmier, sont toujours à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez sur la maladie et le traitement de votre enfant. D'autre part, vous avez toujours la possibilité de prendre un rendez-vous à un autre moment.

Le coordinateur des soins établit le programme de traitement et planifie les examens et les rendez-vous nécessaires. Vous pouvez vous adresser au coordinateur pour avoir des explications sur le déroulement pratique de la thérapie et des examens.

Il y a des pharmaciens attachés à notre service. Vous pouvez toujours vous adresser à eux si vous avez des questions sur vos médicaments. Lors de chaque sortie de l'hôpital, nous passons en revue les médicaments à prendre.

Au début de votre traitement, le dentiste passera aussi vous voir. S'il y a lieu, le dentiste entamera un traitement. Le dentiste vous expliquera en détail comment garder une bonne hygiène buccale et y veillera tout au long de votre traitement.

Des psychologues sont présents pour vous soutenir et vous accompagner, ainsi que votre enfant, durant cette période difficile. Les assistants sociaux vous aident pour les nombreux documents. Vous pouvez avoir recours à eux pour toutes les attestations et les formalités administratives.



Pour toute question concernant l'alimentation, vous pouvez vous adresser au diététicien. Le diététicien vous informera sur tous les problèmes alimentaires qui peuvent surgir.

Les kinésithérapeutes et ergothérapeutes veillent à la rééducation physique de votre enfant.

Avec le musicothérapeute, les enfants se libèrent de leur colère et de leurs frustrations ou expriment leurs sentiments positifs à travers la musique. Le thérapeute vient dans la chambre ou fait de la musique avec les enfants dans la salle de musique.

La salle 'de bonte specht' ('le pic épeiche') est une salle de jeux, véritable refuge où les enfants peuvent s'adonner à toutes sortes d'activité. Cette pièce est leur domaine: médecins, infirmiers et parents s'y rendront le moins possible. En cas d'isolement, des activités sont prévues dans la chambre.

Par ailleurs, nous ne négligeons pas le travail scolaire. L'école de l'hôpital assurera l'enseignement de votre enfant pendant cette période difficile, ceci en concertation avec son école habituelle.

Dans certains cas, une aide à domicile doit être prévue, par exemple des soins infirmiers. Ceci est pris en charge par l'équipe des soins à domicile.

Si des questions vous trottent dans la tête, notez-les et posez-les à la première occasion. Dans tous les cas, vous pouvez vous adresser aux infirmiers(ères), qui contacteront les bonnes personnes.

Le service d'hémato-oncologie pédiatrique
Hospitalisation enfants B

DIRECTIVES GÉNÉRALES



La prise de médicaments

Beaucoup d'enfants ont du mal à avaler des pilules. C'est souvent dû au fait qu'ils ne l'ont jamais fait auparavant. Il faudra pourtant, à un moment donné, que votre enfant apprenne à avaler des

pilules, car ces médicaments font partie du traitement. Nous commençons très vite à les y habituer, et vous aussi pouvez y contribuer.

Voici quelques suggestions.

- ❁ Restez calme et positif(ve).
- ❁ Expliquez à votre enfant pourquoi il doit prendre les pilules.
- ❁ Si une pilule a mauvais goût, dites-le franchement. Évitez de mélanger des médicaments avec un aliment ou une boisson. Le goût des pilules sera alors associé à la nourriture.
- ❁ Montrez calmement, une seule fois, comment il faut avaler une pilule : poser la pilule bien loin sur la langue, prendre une gorgée d'eau et avaler la pilule. Après la prise, laissez votre enfant boire encore un peu d'eau.



- ❁ Pour apprendre à avaler, il vaut mieux procéder par étapes. Laissez par exemple votre enfant s'exercer avec de tout petits bonbons. Si cela se passe bien, passez à une taille supérieure, jusqu'à atteindre la taille de la pilule qu'il doit prendre. Ces exercices doivent être de courte durée (5 à 10 minutes) et doivent être répétés plusieurs jours.
- ❁ Pendant la prise des médicaments, évitez autant que possible les distractions et les interruptions.
- ❁ Si votre enfant a des haut-le-cœur ou vomit, restez calme. Laissez-lui le temps de se remettre. Si votre enfant vomit dans les 30 minutes qui suivent la prise, il faudra lui donner à nouveau le médicament. Dans ce cas, veillez à en informer l'infirmier(ère).
- ❁ Si la prise s'est bien passée, félicitez chaleureusement votre enfant.
- ❁ Dans certains cas, la prise est plus facile en cassant la pilule en deux ou en quatre. Certaines pilules peuvent, si nécessaire, être concassées plus finement et prises à la cuillère avec un peu de yaourt, de glace ou de compote, ou être dissoutes dans de l'eau avec un peu de grenadine. Dans ce cas, expliquez-le à votre enfant.
- ❁ Prévoyez une petite récompense, comme un autocollant ou un petit jeu.
- ❁ Certains médicaments sont aussi disponibles sous forme liquide ou sous forme de capsule. Les médicaments liquides peuvent être donnés avec une cuillère ou un verre gradué ou peuvent être injectés dans la bouche à l'aide d'une seringue. Votre enfant peut les prendre purs ou dilués dans de l'eau et/ou de la grenadine.

Si votre enfant a du mal à prendre ses médicaments, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide. Les psychologues de notre service pourront aussi vous aider, ainsi que votre enfant.

Des petites inflammations douloureuses dans la bouche ou la gorge peuvent parfois rendre la prise de pilules difficile. Dans ce cas, veuillez toujours à en informer l'infirmier(ère).

Ne donnez pas d'autres médicaments (vitamines, produits homéopathiques,...) à votre enfant avant d'en avoir discuté avec votre médecin traitant. Certaines préparations peuvent en effet contenir des produits qu'il vaut mieux ne pas combiner avec la chimiothérapie.

Soins de la bouche

Une bonne hygiène buccale est absolument indispensable. Toutes sortes de germes peuvent en effet passer dans les vaisseaux via les muqueuses de la bouche et provoquer ainsi des infections graves.

Quelques conseils :

- ★ Veillez à ce que votre enfant se brosse soigneusement les dents deux fois par jour avec une brosse à dents douce ou medium. Même si votre enfant a des aphtes, il est très important qu'il se brosse les dents. On peut utiliser, dans ce cas, des bâtonnets avec tête en mousse.
- ★ 30 minutes après le brossage des dents, la bouche doit être rincée avec un liquide désinfectant (Perio-Aid®) pendant 60 secondes (surveillez votre montre) pour éviter toute infection secondaire.



- ★ Remplacez la brosse à dents chaque mois et placez-la tête en haut dans le gobelet prévu à cet effet.

Fièvre

Les directives en cas de fièvre sont les suivantes:

- Si vous constatez une seule fois une fièvre de 38 °C, attendez une heure sans donner un médicament fébrifuge.
- Prenez la température une deuxième fois après une heure. Si la température est de moins que 38 °C, attendez jusqu'au prochain sommet de fièvre. Si la température est de 38 °C ou plus, prévenez immédiatement l'hôpital.
- En cas d'une fièvre de plus de 38 °C, prévenez toujours immédiatement l'hôpital. Attention: ne donnez un médicament fébrifuge que si le médecin le permet.



Si nécessaire, l'enfant sera admis à l'hôpital pour y recevoir des antibiotiques en intraveineuse. Cette hospitalisation dure au minimum trois jours. Le seul médicament que votre enfant peut recevoir contre la fièvre est le paracétamol, comme Dafalgan® ou Perdolan®, mais en aucun cas Brufen®, Junifen® ou Aspirine®.

Constipation

Si votre enfant souffre de constipation, veillez à ce qu'il boive en suffisance. On peut éventuellement commencer à lui donner un laxatif (sirop Duphalac®, sachets Forlax® ou Movicol®). Il est important que ce traitement soit poursuivi le temps nécessaire (demandez la carte des selles). L'administration de certains médicaments, comme Vincristine®, peut notamment provoquer un peu de constipation pendant quelques jours.

Les mesures ci-dessus sont en général suffisantes, mais surveillez dans tous les cas la fréquence des selles et prévenez-nous en cas de problèmes persistants.

Douleur

Il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles votre enfant ressent des douleurs :

- ★ la maladie ou la tumeur elle-même;
- ★ effets secondaires des médicaments: mal au ventre, mal aux mâchoires ou douleurs musculaires suite au traitement, p. ex. après l'administration de Vincristine® (chimiothérapeutique);
- ★ inflammations et infections pendant la période de traitement;
- ★ stomatite aiguë (inflammation de la muqueuse buccale);
- ★ mal au ventre et diarrhée consécutifs à la chimiothérapie.

La douleur doit être traitée de façon adéquate. On commencera par du paracétamol. Si ceci ne permet pas de maîtriser la douleur, on peut passer à du contramal/tradonal sous forme de gouttes. Si l'on ne parvient pas à contrôler la douleur avec des médicaments par voie orale, on peut alors envisager une médication intraveineuse (par perfusion). Ceci se fait toujours en accord avec le médecin traitant. Une admission dans le service est alors recommandée.

Hémogramme

La chimiothérapie et la radiothérapie agissent sur les cellules à division rapide dans notre corps. Si les cellules malades en sont affectées, certaines cellules saines le sont également (par exemple les cellules pi-



leuses, ce qui peut entraîner une chute des cheveux). Nos cellules sanguines, elles aussi, sont renouvelées régulièrement et sont donc à division rapide. Dans notre moelle osseuse, de nouvelles cellules sanguines sont fabriquées en permanence. La thérapie a pour effet de réduire cette production de nouvelles cellules. Dans la moelle osseuse, trois sortes de cellules sanguines sont fabriquées :

Globules rouges (RBC)

Dans les globules rouges se trouve l'hémoglobine (Hb) avec une valeur normale de > 12 mg/dl.

L'hémoglobine assure le transport de l'oxygène vers les différents tissus. Une personne qui a trop peu de GR/hémoglobine se sent faible et fatiguée et a des maux de tête. On peut y remédier par un apport de sang (transfusion sanguine). Une transfusion est pratiquée lorsque le taux d'hémoglobine est < 7 mg/dl. L'administration de sang dure entre deux et quatre heures.

Plaquettes (BP)

Les plaquettes ou thrombocytes ont une valeur normale de $> 100\ 000$ à $150\ 000$ /ml.

Les plaquettes assurent une bonne coagulation. S'il y a trop peu de plaquettes, il peut se produire des saignements spontanés, comme des saignements de nez, de gencives, des hémorragies sous-cutanées, l'apparition de grandes plaques bleues ou des petites hémorragies punctiformes (pétéchies). On peut compenser ce déficit par un apport de plaquettes. Des plaquettes sont administrées s'il y en a moins de $10\ 000$ /ml. L'administration dure une bonne demi-heure.

Globules blancs (WBC ou leucocytes)

Les globules blancs ont une valeur normale entre 5 000 et 15 000/ml. Les globules blancs nous défendent contre les infections. Un manque de globules blancs est dangereux, d'où l'importance de prendre en compte une série de règles visant à réduire le risque d'infection (voir aussi les directives relatives à la prévention des infections). Si le nombre de WBC est inférieur à 1 000/ml (aplasie) et si votre enfant a de la fièvre ($> 38,5^{\circ}\text{C}$), il doit être hospitalisé. Les globules blancs ne peuvent pas être administrés par voie de transfusion.

L'effet de la chimiothérapie sur les globules se produit en général entre sept et dix jours après l'administration du traitement. Les contrôles intermédiaires de l'hémogramme se font en accord avec les parents et le médecin traitant, chez le médecin de famille, le pédiatre ou dans la salle de jour. Le cathéter à chambre implantable n'est généralement pas utilisé pour ces contrôles intermédiaires (le plus souvent une piqûre dans le doigt ou le bras).

Contact avec l'urine et les selles

Après une séance de chimiothérapie ou un examen dans lequel des isotopes sont utilisés (scan osseux, PET-scan, MIBG), il faut éviter tout contact direct avec les selles et l'urine. Les substances anatomiques (comme l'urine, les selles, etc.) peuvent en effet, après une chimiothérapie ou certains examens utilisant des substances radioactives, être toxiques. Veillez par conséquent, pendant une semaine après l'arrêt de la chimiothérapie, à porter des gants en cas de contact avec les selles ou l'urine de votre enfant. Tenez compte de cette règle à la maison. Utilisez par exemple des gants pour changer les couches.



Quelques conseils

- ❁ Soyez prudent(e) en ce qui concerne l'urine et les selles.
- ❁ Veillez à ce que votre enfant s'asseye sur la toilette pour uriner afin d'éviter les éclaboussures.
- ❁ Rincez toujours la toilette deux fois avec le couvercle baissé.
- ❁ Après le passage à la toilette, lavez soigneusement vos mains et celles de votre enfant.
- ❁ Soyez prudent(e) également lorsque vous devez nettoyer des vomissures. Si nécessaire, mettez des gants en plastique.
- ❁ Les femmes enceintes doivent redoubler de prudence pour ce qui est du contact avec l'urine, les selles et les vomissures et porteront autant que possible des gants en plastique.

Sommeil

Malgré la maladie de votre enfant, nous recommandons fortement que les enfants dorment dans leur propre lit et dans leur propre chambre. Ceci n'est pas seulement important pour des raisons d'hygiène, mais aussi d'un point de vue pédagogique. Il est dès lors hautement déconseillé de laisser les enfants dormir avec leurs parents.



Autre directives

Vaccinations

Pendant le traitement par chimiothérapie, il vaut mieux ne pas inoculer à votre enfant un vaccin vivant (par exemple rougeole, oreillons, rubéole). Cela pourrait le rendre sérieusement malade. En outre, il n'est pas certain que votre enfant produira suffisamment d'anticorps après la vaccination. Après l'arrêt de la chimiothérapie, votre enfant peut, au bout de six mois et en accord avec le médecin, être à nouveau vacciné selon le programme de vaccination. Il est conseillé, par contre, de faire vacciner les autres membres de la famille contre la grippe à l'approche de l'hiver.

Médicaments de soutien

Le traitement a pour effet de réduire fortement la résistance de votre enfant. Les bactéries, les levures et les champignons qui sont présents chez toute personne normale peuvent, lorsque la résistance est à ce point affaiblie, provoquer des infections. C'est pourquoi certains enfants sont traités aux antibiotiques et/ou aux antifongiques à titre préventif. Le médecin traitant déterminera si ceci est nécessaire dans le cas de votre enfant. En outre, votre enfant devra prendre au besoin du Bactrim® ou de l'Eusaprim® en pilules ou en sirop pendant toute la durée de la thérapie afin de protéger ses poumons.



DIRECTIVES POUR LA PRÉVENTION DES INFECTIONS

En raison de la maladie et du traitement, votre enfant n'est pas en mesure, actuellement, de se protéger au mieux contre les germes pathogènes. La plupart des infections chez les enfants dont les défenses sont réduites proviennent de germes qui sont présents dans leur corps. À la maison, les mesures d'hygiène normales suffisent. Cela signifie avant tout, pour votre enfant et toute la famille, se laver soigneusement les mains avec du savon. Il se peut aussi que des germes soient transmis de l'extérieur, par exemple par la nourriture ou les contacts sociaux. Veuillez à respecter quelques règles de vie afin de prévenir autant que possible les infections, mais faites aussi en sorte que votre enfant et votre famille continuent à mener une vie aussi normale que possible malgré le diagnostic et la thérapie difficiles.

Règles de vie

École

Les enfants atteints d'un cancer peuvent en principe aller normalement à la crèche ou à l'école. Cependant, dans la pratique, ce n'est pas toujours réalisable, parce que l'enfant doit être inscrit à la crèche et parce qu'aller régulièrement à l'école s'avère souvent impossible. C'est pourquoi on met en place, pour la plupart des enfants, l'enseignement à domicile et Bednet. Si votre enfant veut aller à l'école et en a la capacité, c'est possible.

La fréquentation scolaire est très importante pour le développement de l'enfant. Veuillez cependant à informer l'instituteur et le directeur de l'école de la maladie de votre enfant. Pour les enseignants et les autres élèves, il existe aujourd'hui toute une documentation disponible sous forme de livres, de brochures et de valises éducatives. Si nécessaire, les collaborateurs de l'école de l'hôpital peuvent aussi prendre contact avec l'école de votre enfant. Si la varicelle circule dans la classe de votre en-

fant, il faut que l'école vous contacte. La possibilité que votre enfant aille à l'école dépendra alors de son immunité contre la varicelle.

Votre enfant peut en principe participer à toutes les activités scolaires, y compris les voyages scolaires. Une excursion vers une attraction touristique, par exemple, ne pose aucun problème. Les enfants sans neutropénie peuvent a priori prendre part à toutes les activités. Il est conseillé d'éviter les lieux publics fort fréquentés et mal ventilés et les transports publics.

Sport

Si sa condition le permet, votre enfant peut pratiquer n'importe quel sport. En période de thrombocytopénie ($< 50\ 000/\mu\text{L}$), il faut éviter les sports de contact. La natation est autorisée dans les piscines (tropicales), mais pas en mer, en rivière ou dans un lac. Marcher dans l'eau de mer est par contre autorisé. Les bains chauds à bulles sont déconseillés. On peut nager avec un PAC (sauf s'il est percé), mais pas avec un Hickman ou un Broviac (cathéter tunnelisé). Jouer sur la plage est également autorisé. Jouer dans un bac à sable à la maison peut se faire également, pour autant qu'il soit recouvert quand l'enfant n'y joue pas.

Vacances

Choisissez de préférence une destination de vacances dans un pays avec des services médicaux de qualité et facilement accessibles. Une lettre reprenant l'essentiel des antécédents médicaux peut être remise. Évitez les bains de soleil prolongés et couvrez autant que possible la peau de votre enfant, p. ex. avec un T-shirt et une casquette. Appliquez-lui aussi une crème solaire à haut facteur de protection. Un voyage en avion ne pose pas de problème.

Animaux domestiques

Certains animaux domestiques sont admis. Vu le risque d'infection, le patient doit éviter de nettoyer le bac du chat ou la cage du lapin (voir aussi la brochure 'Wat met huisdieren als je kind kanker heeft?' (Qu'en est-il des animaux domestiques si votre enfant a un cancer ?)).



Règles à suivre pour aider à prévenir les infections

- ✿ Une bonne hygiène corporelle quotidienne est toujours importante.
- ✿ Lavez fréquemment les mains de l'enfant avec un savon doux ordinaire, en particulier avant les repas et après chaque passage aux toilettes.
- ✿ Gardez les ongles courts et éliminez toute saleté visible.
- ✿ Veillez à ce que l'enfant se brosse les dents deux fois par jour. Utilisez une brosse à dents douce ou medium individuelle et remplacez-la chaque mois. Utilisez aussi un gobelet individuel pour rincer la bouche. En cas de douleurs dans la bouche, vérifiez la présence éventuelle de petites ampoules (aphtes). Consultez dans ce cas le médecin généraliste ou le médecin traitant (voir aussi la brochure 'Soins de la bouche').
- ✿ Il faut éviter de marcher pieds nus pour éviter des plaies. Prévoyez toujours des claquettes, des pantoufles ou d'autres chaussures et veillez à ce que toute la famille soit solidaire.
- ✿ Faites attention au soleil : avec la médication, l'enfant est plus sensible aux coups de soleil. Utilisez donc une crème solaire à haut facteur de protection et évitez de rester trop longtemps au soleil. Si l'enfant va à l'extérieur, veillez à ce qu'il soit couvert et porte une casquette ou une écharpe.
- ✿ Jouer sur la plage est autorisé. Jouer dans un bac à sable à la maison peut se faire également, pour autant qu'il soit recouvert quand l'enfant n'y joue pas.

- ❁ Si un autre membre de la famille est malade, prévenez sans attendre votre médecin et limitez autant que possible les contacts directs (éternuer, tousser, embrasser). Un frère ou une soeur malade ne doit pas quitter la maison.
- ❁ Expliquez clairement aux enfants qu'il vaut mieux ne pas boire au même verre.
- ❁ Pour les boissons, utilisez chaque jour une nouvelle bouteille.
- ❁ Ne laissez pas l'enfant boire aux fontaines d'eau et au robinet.
- ❁ Lavez les peluches de préférence une fois par semaine.
- ❁ Évitez le contact direct avec des animaux domestiques. Il faut éviter, par exemple, qu'ils lèchent le visage de votre enfant. Lavez-lui soigneusement les mains après qu'il ait joué avec son animal de compagnie.
- ❁ Il ne faut pas éloigner les animaux domestiques, mais il faut éviter qu'ils aillent dans la chambre et dans la cuisine. Votre enfant ne doit pas nettoyer le bac du chat ou la cage du lapin.
- ❁ Dans la maison, le nettoyage habituel est suffisant pour maintenir une bonne hygiène. Vous ne devez pas acheter de détergents spéciaux. Néanmoins, soyez particulièrement attentif(ve) aux sanitaires.
- ❁ Changez les draps du lit une fois par semaine. Remplacez aussi une fois par semaine (ou plus souvent si nécessaire) le pyjama de votre enfant.
- ❁ Il est déconseillé de fumer dans la maison.



- ❁ Des promenades régulières sont conseillées, sauf en cas de pluie ou de brouillard.
- ❁ Il est agréable pour votre enfant de recevoir des visites. Demandez à vos visiteurs d'appeler avant de venir et assurez-vous qu'aucun d'eux n'est malade.



- ❁ Si votre enfant reçoit régulièrement la visite d'amis, expliquez-leur simplement les principales règles d'hygiène.
- ❁ Évitez tout contact avec des personnes malades.
- ❁ Évitez les endroits très animés ou mal aérés.
- ❁ Allez au magasin lorsqu'il y a moins de monde.
- ❁ Allez au cinéma pendant les jours scolaires.

Signes pouvant indiquer la présence d'une infection

- ★ Fièvre > 38°C
- ★ Toux ou respiration rapide
- ★ Diarrhée
- ★ Maux de ventre ou d'estomac
- ★ Maux de tête
- ★ Mal de gorge
- ★ Mal aux oreilles
- ★ Ulcérations, rougeur ou douleur dans la région de l'anus
- ★ Miction douloureuse
- ★ Éruptions cutanées, ampoules ou plaques rouges et douloureuses



Si votre enfant fait 38°C de fièvre ou si la fièvre dure plus d'une heure (température à prendre sous le bras), contactez directement le service.



DIRECTIVES CONCERNANT L'ALIMENTATION

Pour éviter que votre enfant, pendant la période de traitement, contracte des infections par la prise d'aliments, il convient de suivre les règles ci-dessous. Le diététicien passera à cet effet dans la chambre. Une brochure séparée décrit en détail les règles en matière de nutrition. Demandez-la au diététicien.

ACHATS

- X Évitez les emballages endommagés.
- X Vérifiez la date de péremption.
- X Ramenez le plus vite possible vos achats réfrigérés et congelés.

CONSERVATION ET PRÉPARATION

- X Conservez et préparez les repas dans un environnement hygiénique.
- X Conservez séparément les aliments crus et les aliments préparés.
- X Conservez les produits préparés dans des récipients fermés.
- X Cuisez à fond la viande, le poisson, la volaille et les œufs.

ALIMENTS À RISQUE

- X Viande crue, poisson, volaille et œufs et toutes les préparations qui contiennent ces aliments
- X Fromages persillés et non pasteurisés (voir l'emballage)
- X Fruits secs non traités

HYGIÈNE

- X Lavez-vous les mains et séchez-les soigneusement avant de préparer et servir le repas et de manger.
- X Utilisez des ustensiles de cuisine propres et changez chaque jour d'essuie-main et de torchon.

COORDONNÉES DU SERVICE D'HÉMATO- ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE

Coordinateur des soins tél. 016 34 06 41

Unité de soins tél. 016 34 58 07

tél. 016 34 58 08

Hôpital de jour tél. 016 34 31 41

Soins à domicile tél. 016 34 33 42



QUESTIONS OU REMARQUES

Ruled lines for writing questions or remarks.



© mars 2020 UZ Leuven

Ce texte et ses illustrations ne peuvent être reproduits qu'avec l'accord du service Communication de l'hôpital universitaire de Leuven (UZ Leuven).


Conception et réalisation

Ce texte a été rédigé par le service d'héματο-oncologie pédiatrique en collaboration avec le service de communication.

Cette brochure peut également être consultée sur www.uzleuven.be/fr/brochure/700018.

Les remarques ou suggestions concernant cette brochure peuvent être adressées à communicatie@uzleuven.be.

Éditeur responsable
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
tél. 016 33 22 11
www.uzleuven.be

 mynexuzhealth



Consultez votre dossier médical
sur www.mynexuzhealth.be ou

