



Traitement par infliximab

informations pour les patients

DOIS-JE ÊTRE À JEUN POUR UN TRAITEMENT PAR INFlixIMAB ?

Il n'est pas nécessaire d'être à jeun pour recevoir une perfusion d'infliximab.

QUELLE EST LA DURÉE D'UNE PERFUSION ?

Au début, le traitement par infliximab dure environ deux à quatre heures. À partir de la cinquième perfusion, la durée peut généralement être réduite à une heure.

- Durée de la perfusion

1re perfusion	2e perfusion	3e perfusion	4e perfusion	à partir de la 5e perfusion
2 heures	3 à 4 heures	3 à 4 heures	2 heures	1 heure

Demandez à quelqu'un de vous accompagner pour la deuxième et la troisième perfusion.

EFFETS SECONDAIRES

Comme avec tout médicament, des effets secondaires peuvent se produire et ce, pendant l'administration de la perfusion ou par après. Les effets secondaires les plus fréquemment rapportés sont les nausées, les douleurs d'estomac et les maux de tête, mais des démangeaisons, un gonflement ou une rougeur de la peau, des vertiges, une pression artérielle basse et des douleurs thoraciques peuvent également se produire.

L'infliximab peut réduire votre résistance, ce qui augmente le risque d'infections telles que l'herpès ou la grippe. Les infections des voies respiratoires supérieures, comme la sinusite, sont les plus courantes.

VOUS ÊTES MALADE AVANT, PENDANT OU APRÈS VOTRE TRAITEMENT ?

Vous êtes malade ou avez de la fièvre ($> 37,8^{\circ}\text{C}$) **avant** votre traitement ?
Prévenez l'unité de perfusion en temps utile, tél. +32 16 34 45 26.

Si des symptômes apparaissent **pendant** le traitement, informez toujours l'infirmier/ère responsable.

Vous rencontrez des problèmes **après** le traitement ? Dans ce cas, contactez le personnel infirmier MICI.

Conseils

- ✓ Vous avez un rendez-vous chez votre médecin ou votre dentiste ? Signalez toujours que vous suivez un traitement par infliximab.
- ✓ Vous avez subi une prise de sang ou un examen en dehors de l'UZ Leuven ? Munissez-vous toujours des résultats lorsque vous venez à l'hôpital.
- ✓ Vous devez subir une intervention chirurgicale ou une procédure spécifique ? Vous avez des projets de voyage (lointain) ? Vous voulez tomber enceinte ? Informez-en votre médecin ou votre infirmier/ère en temps utile.
- ✓ Demandez la brochure sur la vaccination pour les patients MICI.
- ✓ Dites exactement quels médicaments vous prenez. Dressez-en la liste et notez également la dose par médicament.
- ✓ N'oubliez pas de demander vos prescriptions/attestations à votre médecin.

QUE FAUT-IL FAIRE AVANT DE COMMENCER LE TRAITEMENT PAR INFLIXIMAB ?

Une radiographie des poumons (RX thorax) et un test cutané (in-tradermo) sont tout d'abord effectués pour exclure une exposition antérieure à la tuberculose. Ensuite, votre médecin ou l'infirmier/ère MICI vérifiera vos vaccinations conjointement avec vous.

GROSSESSE ET VACCINATIONS

Si vous avez reçu de l'infliximab pendant votre grossesse, il est important d'en informer le médecin de votre enfant avant qu'un vaccin ne lui soit administré. Votre enfant ne peut pas recevoir de 'vaccin vivant', tel que le vaccin contre le rotavirus, pendant les neuf premiers mois suivant sa naissance.

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU TRAITEMENT PAR INFLIXIMAB

- **Étape 1:** vérification des symptômes. L'infirmier/ère vous accompagne jusqu'à votre fauteuil et vous pose quelques questions générales. Il/Elle vous demande notamment si vous avez préalablement rempli et envoyé le questionnaire en ligne via Mynexuzhealth. De cette façon, vous gagnez du temps.
- **Étape 2:** mesure des paramètres : tension artérielle, pouls, température, poids
- **Étape 3:** prise de sang
- **Étape 4:** pose de la perfusion et administration de l'infliximab
- **Étape 5:** retrait de la perfusion et contrôle des paramètres
- **Étape 6:** prise d'un nouveau rendez-vous

INSCRIPTION

Vous devez toujours vous inscrire à la réception dans le hall d'accueil principal de l'hôpital. Vous recevez ensuite un bracelet sur lequel figurent vos données personnelles. Suivez ensuite la flèche dorée jusqu'à l'unité E 420 au quatrième étage.

IMPORTANT

- Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre rendez-vous, veuillez en informer l'unité de perfusion en temps utile au 016 34 45 26.
Nous pourrions ainsi accueillir un autre patient à votre place.
- Vous ne pouvez pas quitter l'unité de perfusion pendant le traitement.
- L'accès à Internet est fourni.
- Dans des circonstances normales, vous pouvez rentrer chez vous par vos propres moyens après le traitement.
- Veuillez remplir le questionnaire Mynexuzhealth au moins 48 heures à l'avance.

D'AUTRES QUESTIONS ?

Contactez votre personnel infirmier MICI par e-mail à l'adresse ibdnurse@uzleuven.be

Pour les cas urgents : tél. 016 34 06 21 (de 10h00 à 12h00)

© Décembre 2021 UZ Leuven

La reproduction de ce texte et des illustrations n'est possible qu'avec l'autorisation du service communication de l'UZ Leuven.

Conception et réalisation

Ce texte a été rédigé par la clinique MICI en coopération avec le service communication.

Vous trouverez également cette brochure sur
www.uzleuven.be/fr/brochure/701293.

Veuillez envoyer tout commentaire ou suggestion concernant cette brochure à communicatie@uzleuven.be.

Editeur responsable
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
Tél. 016 33 22 11
www.uzleuven.be

 my nexuz health



Consultez votre dossier médical
sur nexuzhealth.com ou

