

# HYPOGLYCEMIE

## Symptomen

✓ wisselend humeur

✓ hoofdpijn

✓ beven

✓ zweten



✓ duizeligheid

✓ bleekheid

✓ vermoeidheid

✓ slecht zien

✓ honger

## Hoe opvangen?




1. Als je bij bewustzijn bent:



Bij pomptherapie: géén trage koolhydraten nemen.

## \*Opmerking

- 1,5 g KH/10 kg lichaamsgewicht (max. 6 g)
  - = ½ tablet druivensuiker
  - = 15 ml cola
  - = 2 ml grenadine
- 5 g KH van een droge koek
  - = 1 petit-beurre
  - = 6 g letterkoekjes
  - = 1 berenkoek



De hoeveelheid koolhydraten van producten kan verschillen van merk tot merk. Controleer daarvoor de verpakking.

## 2. Als je bewusteloos bent en/of hulp nodig hebt van anderen:

### Hypo-Fit® Junior


Smeer gel op de binnenkant van de wangen.  
Als het kind bij bewustzijn komt, kun je indien nodig nog druivensuiker of echte cola geven.



Als Hypo-Fit® niet helpt:

### ★ GlucaGen® Hypokit

- 1 mg GlucaGen® intramusculair (in de spier van de dij)  
of
- 0,5 mg GlucaGen® indien gewicht < 25 kg



OF

### ★ Baqsimi® neusspray

Voor kinderen vanaf 4 jaar en ouder.  
Dit is een neusspray met glucagon.



Bepaal 10 à 15 minuten na het toedienen van Hypo-Fit® Junior en/of GlucaGen® Hypokit of Baqsimi® neusspray de bloedsuiker. Afhankelijk van het resultaat laat je het kind snelle en/of trage koolhydraten eten. Volg de volgende uren de bloedsuikerwaarden op.