

Je therapie: Carboplatine-5FU

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit twee verschillende celremmende geneesmiddelen (cytostatica): Carboplatine en 5FU. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

De onderstaande schema's geven een overzicht van hoe één cyclus van de behandeling Carboplatine-5FU kan verlopen. Je arts en verpleegkundige bespreken met je volgens welk schema de behandeling bij jou wordt toegepast. Eén cyclus duurt telkens 3 weken (21 dagen). Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 3 weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en je algemene toestand dit toelaten.

Carboplatine-5FU via Infusor®

Generieke naam	Merknaam	Dag						Wijze van toediening
		1	2	3	4	5	6-21	
Carboplatine	Paraplatin®	•						Infusor® over 96u (4 dagen)
5FU	Fluoro-Uracil®	• →	→	→	→	//		

Carboplatine-5FU via infuus

Generieke naam	Merknaam	Dag					Wijze van toediening
		1	2	3	4	5-21	
Carboplatine	Paraplatin®	•					Infusor® over 24 uur (* over 22u40 min op d1)
5FU	Fluoro-Uracil®	•*	•	•	•		

WAAR WORDT DE THERAPIE TOEGEDIEND?

Je zal de chemotherapie altijd in het ziekenhuis toegediend krijgen.

Als je behandeling via een Infusor® verloopt, kom je op dag 1 naar het dagcentrum voor de toediening van je therapie. 5FU krijg je via een Infusor®-pompje waarmee je naar huis kunt. Dit pompje werkt dan gedurende 96 uur (4 dagen). Op dag 5 zal de thuisverpleegkundige het Infusor®-pompje komen afschakelen of kom je hiervoor naar het oncologisch dagcentrum.

Als je behandeling via infuus verloopt, word je voor 5 dagen en 4 nachten in het ziekenhuis opgenomen.

AANDACHTSPUNTEN BIJ CARBOPLATINE-5FU

- Het komt af en toe voor dat iemand allergisch reageert op Carboplatine. Een allergische reactie kenmerkt zich door het optreden van: huiduitslag (eventueel over heel het lichaam), gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Soms gaat een reactie gepaard met een gevoel van misselijkheid of met overmatig transpireren. Het is belangrijk dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk te melden aan de verpleegkundige of arts. Er kan dan vlug en adequaat worden gereageerd.
- Zeker als je 5FU via een Infusor® krijgt toegediend, is het belangrijk dat je voldoende (1,5 tot 2 liter per dag) drinkt tijdens de toediening. Anders dan de patiënten die 5FU via een infuus krijgen, krijg je immers geen extra vocht langs de Infusor®.



NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie brochure p. 25)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en
mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven
medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:



~~Hand- en voetverzorging~~



~~Koude voeding en dranken vermijden~~



~~Nagelverzorging~~



~~Een alternatief (pruik, sjaaltje ...) voorzien~~



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie brochure p. 28)

Een verminderd aantal witte bloedcellen
Een verminderd aantal rode bloedcellen
Een verminderd aantal bloedplaatjes

Misselijkheid en braken
Smaak- en reukveranderingen
Mondslimvliesontsteking (bv. aften)

Ongewone vermoeidheid
Invloed op de seksualiteit en intimiteit
Gevoelens van angst, boosheid en verdriet

Bij jouw behandeling kunnen zich ook de volgende nevenwerkingen voordoen:

- Buikloop of diarree
- ~~Verstopping~~
- Haarverlies *haarverdunding, zelden haarverlies*
- ~~Huidveranderingen~~
- ~~Handvoetsyndroom~~
- ~~Nagelveranderingen~~
- ~~Ooglast~~
- Oorsuizingen en verminderd gehoor
- ~~Grieperig gevoel~~
- Tintelingen of voos gevoel in vingertoppen en/of tenen