

Je therapie: Ramucirumab

(Cyramza®)

WAT IS RAMUCIRUMAB?

De werkzame stof in Cyramza® is Ramucirumab. Ramucirumab blokkeert de groei van de bloedvaten die voedingsstoffen en zuurstof naar de tumorcellen brengen. Op die manier kan Ramucirumab de groei van de tumorcellen remmen.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit 1 doelgericht geneesmiddel Ramucirumab. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt 4 weken (28 dagen) en omvat 2 toedieningen. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 4 weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en je algemene toestand het toelaten.

Generieke naam	Merknaam	Dag				Wijze van toediening
		1	2-14	15	16-28	
Ramucirumab	Cyramza®	•		•		Infuus over 60 minuten
Ondersteunende medicatie Zyrtec® 10 mg		•		•		30 minuten vóór toediening Cyramza®

WAAR WORDT DE THERAPIE TOEGEDIEND?

De behandeling kan in het dagziekenhuis gebeuren. Overnachting is dan niet nodig.

AANDACHTSPUNTEN BIJ RAMUCIRUMAB

- Door Ramucirumab kun je last krijgen van **een verhoogde bloeddruk**. Daarom zal je bloeddruk gecontroleerd worden voor en na de toediening van Ramucirumab. Controleer thuis dagelijks je **bloeddruk en polsslag**. Het dagboek biedt ruimte om die gegevens dagelijks te noteren. Zo kan je arts de evolutie van je bloeddruk goed opvolgen en zo nodig bloeddrukverlagers voorschrijven. Als de bloeddruk hoger is dan 140/90mmHg, moet je dat melden aan je arts. Mogelijk krijg je medicatie voorgeschreven tegen verhoogde bloeddruk.
- Het **eiwitgehalte in de urine** kan verhoogd zijn. Daarom zal je urine voor elke toediening gecontroleerd worden.
- Ramucirumab kan **een normale wondgenezing verstoren**. Het is daarom belangrijk dat je eventuele heelkundige ingrepen (bijvoorbeeld aan de tanden) eerst met jouw arts bespreekt. je arts zal sommige

ingrepen tijdens de behandeling met Ramucirumab afraden. Om diezelfde reden is het ook belangrijk dat je eventuele wonden toont aan je arts of verpleegkundige zodat zij een gepaste verzorging kunnen instellen. Bij plotse en abnormale gewaarwordingen zoals pijn of zwelling is het belangrijk dat je onmiddellijk contact opneemt met je (huis)arts.

- **Bloedingen van het slijmvlies** (vooral neusbloedingen), kunnen zich voordoen. Als je thuis een bloedneus hebt, blijf dan rechtop zitten en snuit flink je neus, zodat het meeste bloed eruit is. Daarna knijp je je neus vlak onder het neusbeen minstens 10 minuten dicht. Buig je hoofd licht voorover en blijf rustig ademen langs je mond. Is het bloeden gestopt, probeer dan je neus niet meer te snuiten. Door te snuiten maak je immers mogelijk het bloedstolsel los waardoor je neus opnieuw begint te bloeden. Als je het bloeden niet gestopt krijgt, kun je het best je arts contacteren. Begin alleszins niet zelf met andere maatregelen zoals bloedstelpende watten.
- Tijdens de eerste toediening kan een **infusiereactie** ontstaan. Tijdens een infusiereactie kunnen rillingen, koorts, lage bloeddruk, misselijkheid of braken zich voordoen. Als je een van die symptomen ervaart, verwittig dan onmiddellijk een zorgverlener.