

Vaccinatieschema voor IBD-patiënten

informatie voor patiënten

VACCINATIES MOGELIJK TIJDENS IMMUNO- SUPPRESSIEVE THERAPIE

Influenza/griep: tetravalent vaccin	1x/jaar (november)
Pneumokokken: 1e keer → Apexxnar® na 5 jaar → Pneumovax 23®	1x 1x/5 jaar
Hepatitis A en B Twinrix®	0-1-6 maanden
Hepatitis A Avaxim®, Havrix®, Vaqta®	0-6 maanden
Hepatitis B Engerix-B®, Fendrix®, Hbvaxpro®	0-1-(2)-6 maanden
Tetanus Boostrix®, Revaxis®, Triaxis®	1x/10 jaar
Humaan papillomavirus Cervarix® Gardasil 9®	0-1-6 maanden 0-2-6 maanden
Gordelroos of zona Shingrix®	0-1 maanden
COVID-19-vaccins	volgens de richtlijnen van de overheid

Vaccinaties met een levend verzwakt vaccin zijn niet mogelijk bij patiënten onder immunosuppressieve therapie, enkel na bespreking met de gastro-enteroloog.

- Gele koorts: bij reizen naar Afrika en Zuid-Amerika
- Wind-/waterpokken
- Bof/mazelen/rubella

U kunt uw persoonlijke vaccinatieoverzicht terugvinden via www.mijngezondheid.be, een initiatief van de overheid. Houd er echter rekening mee dat enkel geregistreerde vaccins in dit overzicht worden opgenomen. Als u een vaccin krijgt toegediend, vraag dan na bij uw zorgverlener of die de vaccinatie registreert in Vaccinnet.

Vragen? Contacteer dan de IBD-verpleegkundigen via e-mail: ibdnurse@uzleuven.be.