



Slokdarmmanometrie

informatie voor patiënten

WAT IS EEN SLOKDARMMANOMETRIE?

Een slokdarmmanometrie meet, door middel van een sonde via de neus, de druk in de slokdarm en de maag, met als doel de werking van de slokdarm in beeld te brengen.

De slokdarm is een buisvormig gespierd orgaan, dat zich bevindt tussen de keelholte en de maag. Boven- en onderaan wordt de slokdarm afgesloten door een bovenste en een onderste kringspier of sfincter. Na het slikken wordt de voeding door een knijpende (peristaltische) beweging door het slokdarmlichaam tot in de maag geduwd. De onderste kringspier opent zich vlak na het slikken om het voedsel te laten passeren tot in de maag.

Die verschillende bewegingen worden geregistreerd tijdens de manometrie.

WANNEER WORDT EEN SLOKDARMMANOMETRIE TOEGEPAST?

Een slokdarmmanometrie kan gebeuren bij klachten zoals moeilijkheden of pijn bij het slikken, het vastzitten van voedsel, een zuur gevoel, braken, opboeren van lucht of pijn op de borst waarvoor geen duidelijke verklaring is gevonden.

IS EEN SLOKDARMMANOMETRIE PIJNLIJK?

Over het algemeen wordt een slokdarmmanometrie goed verdragen. De plaatsing van de sonde kan u als onaangenaam ervaren door de passage doorheen de neus en keelholte, maar is meestal niet pijnlijk. Een lokaal verdovende gel kan de binnenkant van uw neus verdoven.

Er kan verder geen verdovende medicatie worden toegediend, omdat uw medewerking tijdens het onderzoek nodig is en u zo normaal mogelijk moet kunnen slikken.

VOORBEREIDING

Breng zeker een verwijsbrief mee als u bent doorverwezen door een arts buiten UZ Leuven.

U moet voor dit onderzoek nuchter zijn. Dat betekent dat u zes uur voorafgaand aan het onderzoek niet meer mag eten of drinken. Belangrijke medicatie, die stipt moet worden ingenomen, mag u wel met een klein slokje water innemen. Het gebruik van medicatie die invloed heeft op de werking van de slokdarm, bespreekt u best vooraf met de arts.

Hieronder vindt u een lijstje met de voornaamste te vermijden medicatie:

- Nifedipine: Adalat®
- Diltiazem: Tildiem®
- Nitraten: Coruno®, Cedocard®, Nitroderm® ... Tenzij deze medicatie omwille van hartproblemen niet kan/mag gestopt worden.
- Prucalopride: Resolor®
- Pyridostigmine: Mestinon®
- Buspirone: Buspar®
- Clebopride: Cleboril®
- Morfine en producten hiervan afgeleid

In nuchtere toestand verloopt het plaatsen van de sonde makkelijker en zijn de meetresultaten van de manometrie betrouwbaarder.

VERLOOP VAN EEN SLOKDARMMANOMETRIE

Bij het begin van het onderzoek gaat u op het bed zitten en wordt indien gewenst de binnenkant van uw neus verdoofd. Daarna wordt de meetsonde via de neus ingebracht, voorbij de keel en de slokdarm, tot in de maag.



plaatsing sonde

Wanneer de sonde zich op de juiste plaats bevindt, wordt ze vastgeplakt aan de neus en mag u zich comfortabel op het bed installeren voor de rest van het onderzoek.



tijdens het onderzoek

U kan tijdens het volledige onderzoek zowel door uw neus als door uw mond ademen.

Afhankelijk van uw klachten krijgt u al dan niet verschillende soorten vocht en voeding toegediend: (licht gezouten) water, appelmoes, brood of een warme maaltijd (puree met appelmoes en vleesbrood).

De reden daarvoor is dat we willen inschatten hoe de slokdarm reageert op verschillende voedselconsistenties. Als u een dieet volgt omwille van medische en/of religieuze redenen, neemt u best vooraf contact op met de dienst.



toediening voedingsbolus

Op het einde van het onderzoek wordt de meetsonde verwijderd.

NA HET ONDERZOEK

Na het onderzoek mag u onmiddellijk naar huis gaan (tenzij er nog andere onderzoeken gepland staan) en mag u terug normaal eten.

IS EEN SLOKDARMMANOMETRIE VEILIG?

Een slokdarmanometrie is veilig. Zelden gebeurt het dat de sonde niet in de slokdarm maar in de luchtpijp terecht komt. In dat geval wordt de sonde onmiddellijk herplaatst.

U kan wel wat irritatie ervaren in de neus en/of de keel door de passage van de sonde.

CONTACTGEGEVENS

Funciemeting motiliteit: tel. 016 34 33 60

Secretariaat maag-, darm-, leverziekten: tel. 016 34 42 25

UZ Leuven telefooncentrale: tel. 016 33 22 11

Spoedgevallendienst: tel. 016 34 39 00

© maart 2021 UZ Leuven

Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie

Deze tekst werd opgesteld door de dienst maag-, darm-, leverziekten in samenwerking met de dienst communicatie.

Je vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/701160.

Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kun je bezorgen via communicatie@uzleuven.be.

Verantwoordelijke uitgever
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
tel. 016 33 22 11
www.uzleuven.be

 mynexuzhealth



Raadpleeg je medisch dossier via
www.mynexuzhealth.be
of download de app

