

# Je therapie: axitinib (Inlyta<sup>®</sup>) (AMO)


DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS 'JE ONCOLOGISCHE BEHANDELING MET TABLETTEN OF CAPSULES'.

## WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel (doelgerichte therapie), namelijk axitinib. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

## HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

- Je komt naar de raadpleging of het dagziekenhuis voor een bloedafname, een klinisch onderzoek en een voorraad tabletten. Je neemt de tabletten dan thuis in.
- Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. **Eén cyclus duurt 4 weken (28 dagen). Axitinib (Inlyta<sup>®</sup>) wordt dagelijks ingenomen.**
- Axitinib bestaat in tabletten van 1 mg en 5 mg. Je arts of verpleegkundige vertelt je welke dosis je dagelijks moet nemen. Afhankelijk van de ernst van de nevenwerkingen die je ondervindt, is een dosisverlaging mogelijk.

| Axitinib (Inlyta <sup>®</sup> ) 2 x per dag |  | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |
|---|--|--------|--------|--------|--------|
| ..... mg 's morgens                         |  of  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| ..... mg 's avonds                          |  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |

## Inname

- Axitinib wordt **tweemaal per dag** ingenomen met **12 uur tussen** beide innames.
- Axitinib wordt systematisch **bij de maaltijd of op een lege maag ingenomen**.
- **Interactie met voeding:** vermijd tijdens de inname van axitinib het eten of drinken van pomelmoes(sap) of preparaten op basis van sint-janskruid.
- **Interactie met medicatie:** pijnmedicatie op basis van aspirine en ontstekingswerende medicatie zoals ibuprofen kan je tijdens de behandeling met axitinib beter vermijden omdat ze het risico op een bloeding verhogen. Paracetamol kan je veilig gebruiken als pijnmedicatie.  
Maagzuurremmers zoals Maalox<sup>®</sup> antacid, Rennie<sup>®</sup>, Gaviscon<sup>®</sup>, omeprazol, pantoprazol ... kunnen een invloed hebben op de werking van axitinib.  
Bespreek het met je behandelende arts als je die medicijnen regelmatig gebruikt.

## Wat als?

Als je een dosis axitinib bent vergeten, **dan sla je de vergeten dosis over**. Neem de volgende dosis op het geplande tijdstip.

**Algemene richtlijnen rond de inname, bewaring en manipulatie en wat je het best doet als zich bepaalde situaties voordoen, kan je vinden in de gids 'je oncologische behandeling met tabletten of capsules'.**

## AANDACHTSPUNTEN BIJ AXITINIB

- Axitinib kan de genezing van een wonde vertragen. Overleg met je behandelende arts als je een ingreep nodig hebt. Mogelijk moet je stoppen met axitinib 5 dagen vóór de ingreep tot 5 dagen na de ingreep.
- Axitinib veroorzaakt soms spierpijn en hoofdpijn. Als je daar veel last van hebt, kan je tot maximaal 4 x per dag 1 gr paracetamol innemen. Meet het best eerst je lichaamstemperatuur om na te gaan of je geen koorts hebt.
- In zeldzame gevallen heeft axitinib een invloed op de bloedsuikerspiegel.



### NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie brochure)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en  
mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven  
medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:



Bloeddruk meten



Hand- en  
voetverzorging



Nagelbescherming



### MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie brochure)

Bij jouw behandeling kunnen zich de volgende nevenwerkingen of klachten voordoen:

- Buikloop of diarree
- Huidveranderingen zoals:
  - Droge huid, schilfering, jeuk, huiduitslag
  - ~~Huiduitslag in de vorm van puistjes~~
  - Huidveranderingen aan de handpalmen en voetzolen
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en reukveranderingen
- Mondslijmvliesontsteking (aften)
- Een verminderd aantal witte bloedcellen
- Een verminderd aantal rode bloedcellen
- Een verminderd aantal bloedplaatjes
- ~~Haarveranderingen~~
- ~~Nagelveranderingen~~
- ~~Verstopping~~
- Verhoogde bloeddruk
- ~~Tintelingen en voos-gevoel~~
- Spier- en gewrichtspijn
- Ongewone vermoeidheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Invloed op de seksualiteit