

Je therapie: ponatinib (Iclusig[®]) (hemato)

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS 'JE ONCOLOGISCHE BEHANDELING MET TABLETTEN OF CAPSULES'.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel (doelgerichte therapie), namelijk ponatinib. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

- Je komt naar de raadpleging of het dagziekenhuis voor een bloedafname, een klinisch onderzoek en een voorraad tabletten. Je neemt de tabletten dan thuis in.
- Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. **Eén cyclus duurt 4 weken (28 dagen). Ponatinib (Iclusig[®]) wordt dagelijks ingenomen.**
- Ponatinib bestaat in tabletten van 15 mg en 45 mg. Je arts of verpleegkundige vertelt je welke dosis je dagelijks moet nemen. Afhankelijk van de ernst van de nevenwerkingen die je ondervindt, is een dosisverlaging mogelijk.

Ponatinib (Iclusig [®])		Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
..... mg x per dag	 of 	✓	✓	✓	✓

Inname

- Ponatinib wordt **één keer per dag ingenomen bij voorkeur 's morgens**.
- Ponatinib wordt systematisch **op een lege maag of bij de maaltijd ingenomen**.
- **Interactie met voeding:** vermijd tijdens de inname van ponatinib het eten of drinken van pompoes(sap), granaatappel, sterfruit of preparaten op basis van sint-janskruid.

Wat als?

Als je een dosis ponatinib bent vergeten, dan **sla je de vergeten dosis over en neem je de volgende dosis op het geplande tijdstip**.

Algemene richtlijnen rond de inname, bewaring en manipulatie en wat je het best doet als zich bepaalde situaties voordoen, kan je vinden in de gids 'je oncologische behandeling met tabletten of capsules'.

AANDACHTSPUNTEN BIJ PONATINIB

- Ponatinib kan een invloed hebben op het vetgehalte (cholesterol) in je bloed en daardoor op je bloedvaten. Probeer daarom je bloeddruk en je gewicht op te volgen. Als je rookt, probeer dan in de mate van het mogelijke te stoppen met roken. Het cholesterolgehalte in je bloed zal regelmatig opgevolgd worden door een bloedafname.
- Door ponatinib kan je last krijgen van hoofd-, spier- en gewrichtspijn. Als je daar veel last van hebt, mag je tot 4 maal per dag 1 gram paracetamol innemen. Meet het best eerst je lichaamstemperatuur om na te gaan of je geen koorts hebt.
- Ponatinib kan mogelijk een invloed hebben op je hartfunctie. Neem contact op met je behandelende arts als je last krijgt van hartkloppingen, pijn op de borstkas of als je kortademigheid ervaart.
- Soms kan je door de inname van ponatinib vocht opstapelen. Daardoor kan je gewicht toenemen.
- In zeldzame gevallen heeft ponatinib een invloed op de leverfunctie. Dat voel je meestal niet, maar de arts kan het in je bloed vaststellen.



NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie brochure)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:



Bloeddruk meten



Hand- en voetverzorging



Nagelbescherming



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie brochure)

Bij jouw behandeling kunnen zich de volgende nevenwerkingen of klachten voordoen:

- Buikloop of diarree
- Huidveranderingen zoals:
 - Droge huid, schilfering, jeuk, huiduitslag
 - ~~Huiduitslag in de vorm van puistjes~~
 - ~~Huidveranderingen aan de handpalmen en voetzolen~~
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en reukveranderingen
- ~~Mondslimvliesontsteking (afters)~~
- Ongewone vermoeidheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Invloed op de seksualiteit
- Een verminderd aantal witte bloedcellen
- Een verminderd aantal rode bloedcellen
- Een verminderd aantal bloedplaatjes
- ~~Haarveranderingen~~
- ~~Nagelveranderingen~~
- Verstopping
- Verhoogde bloeddruk
- ~~Tintelingen en voos gevoel~~
- Spier- en gewrichtspijn