

Je therapie: rituximab (Truxima®)

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel: rituximab (doelgerichte therapie). Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

Hoe werkt de medicatie?

Rituximab hecht zich vast aan een bepaald eiwit op de kankercellen, waardoor de groei van deze cellen kan worden afgeremd.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Rituximab wordt toegediend in combinatie met chemotherapie. Na het stoppen van de chemotherapie wordt rituximab meestal in monotherapie verder gegeven. Rituximab wordt om de 3 weken (21 dagen) toegediend. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 3 weken na dag 1, als de bloeduitslagen en je algemene toestand het toelaten.

Rituximab wordt de eerste keer altijd via een infuus toegediend. Als zich geen infuusreactie heeft voorgedaan, kan je behandelende arts beslissen om vanaf de tweede toediening rituximab toe te dienen via een onderhuidse inspuiting in de buik.

Generieke naam	Merksnaam	Dag		Wijze van toediening
		1	2-21	
Rituximab	Truxima®	•		Tijdens de eerste toediening wordt om het half uur de infuussnelheid verhoogd en duurt de toediening ongeveer 4 uur. Als zich geen reactie heeft voorgedaan, is vanaf de tweede toediening de infuussnelheid korter.
Ondersteunende medicatie • Paracetamol 1g • Cetirizine 10 mg	Dafalgan® Zyrtec®	•		45-60 minuten vóór de toediening van rituximab

WAAR WORDT DE THERAPIE TOEGEDIEND?

Je zal de therapie altijd in het ziekenhuis toegediend krijgen. De behandeling kan in het dagziekenhuis gebeuren.

AANDACHTSPUNTEN BIJ RITUXIMAB

- Een **allergische reactie** kan zich mogelijk voordoen. Die reactie kenmerkt zich door huiduitslag, al dan niet in combinatie met jeuk (eventueel over het hele lichaam), een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Het is belangrijk dat je dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan een verpleegkundige of arts, zodat er vlug en adequaat kan worden gereageerd.

Om een allergische reactie en koorts tegen te gaan, krijg je vóór elke toediening **ondersteunende medicatie**: één tablet paracetamol 1 gram en één tablet cetirizine 10 mg.

Tijdens de eerste toediening wordt je bloeddruk, hartritme en temperatuur goed gevolgd. In het geval dat er een reactie ontstaat, zal je behandelende arts de infusie vertragen of onderbreken en een passende behandeling instellen. Na verbetering van de symptomen kan de infusie worden voortgezet.