

Je therapie: azacitidine (Vidaza[®]) (hemato)

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS CHEMOTHERAPIE.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel (cytostaticum): azacitidine. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt 4 weken (28 dagen) en omvat 7 opnames voor chemotherapie. Azacitidine wordt in de eerste week van de cyclus dagelijks toegediend. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 4 weken na dag 1, als de bloedslagen en je algemene toestand het toelaten.

Generieke naam	Merknaam	Dag		Wijze van toediening
		1-7	8-28	
Azacitidine	Vidaza [®]	•		Onderhuidse inspuiting

WAAR WORDT DE THERAPIE TOEGEDIEND?

Je zal de chemotherapie altijd in het ziekenhuis toegediend krijgen. De toediening gebeurt in het dagziekenhuis oncologie. Tijdens het weekend gebeurt de toediening op de hospitalisatieafdeling van hematologie.

AANDACHTSPUNTEN AZACITIDINE

- De onderhuidse toediening van azacitidine gebeurt afwisselend in de buik, de bovenbenen of de bovenarmen. Het kan nuttig zijn dit zelf mee op te volgen.
- Op de injectieplaats kan je mogelijk last krijgen van roodheid, harde of gevoelige plekken.
- Door de toediening van azacitidine krijg je mogelijk last van hoofdpijn of duizeligheid. Als je veel last hebt van hoofdpijn, mag je 1 gram paracetamol innemen. Meet best eerst je lichaamstemperatuur om na te gaan of je geen koorts hebt. Meld deze klacht zeker aan je zorgverleners.
- Als je last krijgt van kortademigheid, pijn op de borstkas of als je moe bent bij de minste inspanning, meld dat dan zeker aan je zorgverleners.



NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie brochure)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en
mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven
medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:



~~Hand- en voetverzorging~~



~~Koude voeding en dranken vermijden~~



~~Nagelverzorging~~



~~Een alternatief (pruik, sjaaltje ...) voorzien~~



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie brochure)

Een verminderd aantal witte bloedcellen
Een verminderd aantal rode bloedcellen
Een verminderd aantal bloedplaatjes

Misselijkheid en braken
Smaak- en reukveranderingen
Mondslijmvliesontsteking (bv. aften)

Ongewone vermoeidheid
Invloed op de seksualiteit en intimiteit
Gevoelens van angst, boosheid en verdriet

Bij jouw behandeling kunnen zich ook de volgende nevenwerkingen voordoen:

- Buikloop of diarree
- Verstopping
- ~~Haarverlies~~
- ~~Huidveranderingen~~
- ~~Handvoetsyndroom~~
- ~~Nagelveranderingen~~
- ~~Ooglast~~
- ~~Oorsuizingen en verminderd gehoor~~
- ~~Griepig gevoel~~
- ~~Tintelingen of voos gevoel in vingertoppen en/of tenen~~