

Je therapie: acalabrutinib (Calquence®) (hemato)



DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS 'JE ONCOLOGISCHE BEHANDELING MET TABLETTEN OF CAPSULES'.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel (doelgerichte therapie), namelijk acalabrutinib. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

- Je komt naar de raadpleging of het dagziekenhuis voor een bloedafname, een klinisch onderzoek en een voorraad capsules. Je neemt de capsules dan thuis in.
- Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt 4 weken (28 dagen). Acalabrutinib (Calquence®) wordt dagelijks ingenomen.
- Acalabrutinib bestaat in capsules van 100 mg. Je arts of verpleegkundige vertelt je welke dosis je dagelijks moet nemen. Afhankelijk van de ernst van de nevenwerkingen die je ondervindt, is een dosisverlaging mogelijk.

Acalabrutinib (Calquence®) 2x/dag		Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
..... mg 's ochtends	 of 	✓	✓	✓	✓
..... mg 's avonds		✓	✓	✓	✓

Inname

- Acalabrutinib wordt **tweemaal per dag ingenomen met 12 uur tussen beide innames**.
- Acalabrutinib wordt **systematisch op een lege maag of bij de maaltijd** ingenomen.
- **Interactie met voeding:** vermijd tijdens de inname van acalabrutinib het eten of drinken van pompelmoes(sap), zure appelsienen, granaatappel, sterfruit of preparaten op basis van sint-janskruid. Vermijd eveneens het gebruik van visolie, vitamine E en lijnzaad omdat ze het risico op bloeding verhogen.
- **Interactie met medicatie:** pijnmedicatie op basis van aspirine en ontstekingswerende medicatie zoals ibuprofen kan je tijdens de behandeling met acalabrutinib beter vermijden omdat ze het risico op een bloeding verhogen. Bespreek het met je behandelende arts als je die medicijnen regelmatig gebruikt. Paracetamol kan je veilig gebruiken als pijnmedicatie. Ook maagzuurremmers hebben een invloed op de werking van acalabrutinib. Bespreek het met je behandelende arts als je die medicijnen regelmatig gebruikt.

Wat als?

Als je een dosis acalabrutinib bent vergeten, kan je **de vergeten dosis inhalen tot 3 uur na het geplande tijdstip**. Wanneer er meer dan 3 uur is na de geplande tijdstip, dan sla je de vergeten dosis over en neem je volgende dosis op het geplande tijdstip.

Algemene richtlijnen rond de inname, bewaring en manipulatie en wat je het best doet als zich bepaalde situaties voordoen, kan je vinden in de gids 'Je oncologische behandeling met tabletten of capsules'.

AANDACHTSPUNTEN BIJ ACALABRUTINIB

- Acalabrutinib kan mogelijk een invloed hebben op je hartritme. Neem contact op met je behandelende arts als je pijn op de borstkas of hartkloppingen ervaart.

- Als je last krijgt van hoesten of kortademigheid bij geringe inspanning, neem dan contact op met je behandelende arts.
- Acalabrutinib veroorzaakt soms griepachtige verschijnselen zoals spier- en gewrichtspijn. Als je daar veel last van hebt, mag je tot maximaal 4 keer 1 gram paracetamol innemen tegen de pijn. Meet wel vooraf je lichaamstemperatuur om na te gaan of je geen koorts hebt.
- Meld het aan je behandelende arts als je nieuwe huidletsels opmerkt.
- Door de inname van acalabrutinib kan je sneller en makkelijker blijven bloeden. Overleg met je behandelende arts als je een ingreep nodig hebt, bijvoorbeeld het trekken van een tand. Afhankelijk van de ingreep zal de inname van acalabrutinib 3 dagen vóór en na de ingreep stopgezet worden.



NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie brochure)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:



~~Bloeddruk meten~~



~~Hand- en voetverzorging~~



~~Nagelbescherming~~



NEVENWERKINGEN OPVOLGEN

Volg je klachten goed op, meld en bespreek ze tijdig met je zorgverleners. Op die manier kunnen we je zo goed mogelijk ondersteunen. Je leest er meer over in de gids 'Je oncologische behandeling met tabletten of capsules'.



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie brochure)

Bij jouw behandeling kunnen zich de volgende nevenwerkingen of klachten voordoen:

- Buikloop of diarree
- Huidveranderingen zoals:
 - Droge huid, schilfering, jeuk, huiduitslag
 - ~~Huiduitslag in de vorm van puistjes~~
 - ~~Huidveranderingen aan de handpalmen en voetzolen~~
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en geurveranderingen
- ~~Mondslijmvliesontsteking (afters)~~
- Een verminderd aantal witte bloedcellen
- Een verminderd aantal rode bloedcellen
- Een verminderd aantal bloedplaatjes
- ~~Haarveranderingen~~
- ~~Nagelveranderingen~~
- Verstopping
- ~~Verhoogde bloeddruk~~
- ~~Tintelingen en voos gevoel~~
- Spier- en gewrichtspijn
- Ongewone vermoeidheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid