

Je therapie: sonidegib (Odomzo®)

(AMO)


DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE 'GIDS BIJ JE ONCOLOGISCHE BEHANDELING MET TABLETTEN OF CAPSULES'.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel (doelgerichte therapie), namelijk sonidegib. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

- Je komt naar de raadpleging of het dagziekenhuis voor een bloedafname, een klinisch onderzoek en een voorraad capsules. Je neemt de capsules dan thuis in.
- Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. **Eén cyclus duurt 4 weken (28 dagen). Sonidegib (Odomzo®) wordt dagelijks ingenomen.**
- Sonidegib bestaat in capsules van 200 mg. Je arts of verpleegkundige vertelt je welke dosis je dagelijks moet nemen. Afhankelijk van de ernst van de nevenwerkingen die je ondervindt, is een dosisverlaging mogelijk.

Sonidegib (Odomzo®) 1x/dag	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
. mg sonidegib 	✓	✓	✓	✓

Inname

- Sonidegib wordt één keer per dag ingenomen bij voorkeur 's morgens.
- Sonidegib wordt systematisch op een lege maag ingenomen.
- **Interactie met voeding:** vermijd tijdens de inname van sonidegib het eten of drinken van pompoes(sap) of preparaten op basis van sint-janskruid.

Wat als?

Als je een dosis sonidegib bent vergeten, kan je de vergeten dosis inhalen tot 6 uur na het geplande tijdstip, als er meer dan 6 uur is na het geplande tijdstip, sla dan de vergeten dosis over. Neem je volgende dosis op het geplande tijdstip.

Algemene richtlijnen rond de inname, bewaring en manipulatie en wat je het best doet als zich bepaalde situaties voordoen, kan je vinden in de 'Gids bij je oncologische behandeling met tabletten of capsules'.

AANDACHTSPUNTEN BIJ SONIDEGIB

- Door de inname van sonidegib kan je last krijgen van hoofdpijn en/of buikpijn. Als je daar veel last van hebt, mag je tot maximaal 4 keer 1 gram paracetamol innemen tegen de pijn. Meet wel vooraf je lichaamstemperatuur om na te gaan of je geen koorts hebt. Bespreek deze klacht met je behandelende arts.

- Sonidegib kan ernstige afwijkingen veroorzaken aan het ongeboren kind. Gebruik als koppel 2 methodes om een zwangerschap te vermijden (bijvoorbeeld de anticonceptiepil, gecombineerd met een condoom). Bespreek met je behandelende arts of je nog een kinderwens hebt en welke methoden voor jou het meest geschikt zijn.



NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie brochure)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:



Bloeddruk meten



Hand- en voetverzorging



Nagelbescherming



NEVENWERKINGEN OPVOLGEN

Volg je klachten goed op, meld en bespreek ze tijdig met je zorgverleners. Op die manier kunnen we je zo goed mogelijk ondersteunen. Je kan je klachten opvolgen aan de hand van een papieren of elektronisch dagboek. Je leest er meer over in 'Gids bij je oncologische behandeling met tabletten of capsules'.



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie brochure)

Bij jouw behandeling kunnen zich de volgende nevenwerkingen of klachten voordoen:

- Buikloop of diarree
- Huidveranderingen zoals:
 - Droge huid, schilfering, jeuk, huiduitslag
 - ~~Huiduitslag in de vorm van puistjes~~
 - ~~Huidveranderingen aan de handpalmen en voetzolen~~
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en geurveranderingen
- ~~Mondslimvliesontsteking (afters)~~
- Ongewone vermoeidheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid
- Een verminderd aantal witte bloedcellen
- Een verminderd aantal rode bloedcellen
- Een verminderd aantal bloedplaatjes
- Haarveranderingen *haarverduunning*
- ~~Nagelveranderingen~~
- Verstopping
- ~~Verhoogde bloeddruk~~
- ~~Tintelingen en voos gevoel~~
- Spier- en gewrichtspijn