

Je therapie: sazituzumab govitecan (Trodelvy®)

(MBC)

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS CHEMOTHERAPIE.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel: sazituzumab govitecan. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van 1 cyclus van de therapie. 1 cyclus duurt 3 weken (21 dagen) en omvat 2 opnames voor therapie. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 3 weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en je algemene toestand dit toelaten.

Generieke naam	Merknaam	Dag				Wijze van toediening
		1	2-7	8	9-21	
Sazituzumab govitecan	Trodelvy®	•		•		Infuus over 3 uur Indien zich geen infuusreactie heeft voorgedaan, wordt het infuus vanaf cyclus 2 over 90 minuten toegediend

WAAR WORDT DE THERAPIE TOEGEDIEND?

Je zal de therapie altijd in het ziekenhuis toegediend krijgen. De behandeling kan in het oncologisch dagziekenhuis gebeuren. Overnachten is niet nodig.

ONDERSTEUNENDE MEDICATIE

- Op de dag van de therapie neem je 30 minuten vóór de toediening van sazituzumab govitecan 1 g paracetamol (Dafalgan®) en 1 tablet 10 mg cetirizine (Zyrtec®) in. Deze medicatie wordt gegeven om een infuusreactie te voorkomen.
- Om misselijkheid te voorkomen krijg je – vóór de toediening van sazituzumab govitecan – via de bloedbaan Palonosetron® 250 µg en Acidexam® 10 mg toegediend.
- Als je de dagen na de therapie nog last hebt van misselijkheid en/of braken, kan je op dag 2, dag 3 en dag 4 1 capsule dexamethason 10 mg per dag innemen. Ben je ondanks de inname van dexamethason nog steeds misselijk, dan kan je zo nodig 10 mg Primperan® (maximaal 6 per dag) toevoegen.

AANDACHTSPUNTEN BIJ SAZITUZUMAB GOVITECAN

- Het komt af en toe voor dat iemand **een infuusreactie** doet op sazituzumab govitecan. Een infuusreactie kenmerkt zich door huiduitslag (eventueel over heel het lichaam), een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Soms gaat een reactie gepaard met een gevoel van misselijkheid of met overmatig transpireren. Het is belangrijk dat je dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan de verpleegkundige of arts, zodat er vlug en adequaat kan worden gereageerd.



NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie brochure)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:



~~Hand- en voetverzorging~~



~~Koude voeding en dranken vermijden~~



~~Nagelverzorging~~



Een alternatief (pruik, sjaltje ...) voorzien



NEVENWERKINGEN OPVOLGEN

Volg je klachten goed op, meld en bespreek ze tijdig met je zorgverleners. Op die manier kunnen we je zo goed mogelijk ondersteunen. Je kan je klachten opvolgen aan de hand van een papieren of elektronisch dagboek. Je leest er meer over in de gids chemotherapie.



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie brochure)

Een verminderd aantal witte bloedcellen
Een verminderd aantal rode bloedcellen
Een verminderd aantal bloedplaatjes

Misselijkheid en braken
Smaak- en geurveranderingen
Mondslijmvliesontsteking (bv. aften)

Ongewone vermoeidheid
Invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid
Gevoelens van angst, boosheid en verdriet

Bij jouw behandeling kunnen zich ook de volgende nevenwerkingen voordoen:

- Buikloop of diarree
- Verstopping
- Haarverlies
- Huidveranderingen
- ~~Handvoetsyndroom~~
- ~~Nagelveranderingen~~
- ~~Ooglast~~
- ~~Oorsuizen en verminderd gehoor~~
- ~~Grieperig gevoel~~
- ~~Tintelingen of voos gevoel in vingertoppen en/of tenen~~