

Je therapie: entrectinib (Rozlytrek®)

(REO)

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS 'JE ONCOLOGISCHE BEHANDELING MET TABLETTEN OF CAPSULES'.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel (doelgerichte therapie), namelijk entrectinib. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

- Je komt naar het dagziekenhuis of de raadpleging voor een bloedafname, een klinisch onderzoek en een nieuwe voorraad capsules. Je neemt de capsules dan thuis in.
- Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van 1 cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt 4 weken (28 dagen).
- Entrectinib bestaat in capsules 100 en 200 mg. Je arts of verpleegkundige vertelt je welke dosis je dagelijks moet nemen. Afhankelijk van de ernst van de nevenwerkingen die je ondervindt, is een dosisverlaging mogelijk.



Om het effect van de behandeling op de bloedcellen na te gaan, wordt 1 week na de start en op dag 15 tijdens de eerste 3 cycli een bloedafname aanbevolen. Dat gebeurt het best door de huisarts, net als de opvolging van de resultaten. Je kan hiervoor een laboformulier krijgen in het ziekenhuis. Op het formulier staat vermeld hoe de resultaten correct verstuurd kunnen worden naar UZ Leuven. Valt dag 15 op een vrijdag, gelieve dan een dag eerder naar de huisarts te gaan. Zo zijn de resultaten tijdig gekend vóór de aanvang van het weekend.

Entrectinib (Rozlytrek®)		Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
1x per dag mg	 of 	✓	✓	✓	✓

Inname

- Entrectinib wordt één keer per dag ingenomen.
- Entrectinib wordt systematisch op een lege maag of bij de maaltijd ingenomen.
- **Interactie met voeding:** vermijd tijdens de inname van entrectinib het eten of drinken van pompoes(sap), bittere sinaasappelen (Sevilla) of preparaten op basis van sint-janskruid.

Wat als?

Als je een dosis entrectinib bent vergeten, kan je de vergeten dosis inhalen tot 12 uur na het geplande tijdstip. Wanneer er minder dan 12 uur is vóór de volgende dosis, sla je de vergeten dosis over en neem je volgende dosis op het geplande tijdstip.

Algemene richtlijnen rond de inname, bewaring en manipulatie en wat je het best doet als zich bepaalde situaties voordoen, kan je vinden in de gids 'Je oncologische behandeling met tabletten of capsules'.

AANDACHTSPUNTEN BIJ ENTRECTINIB

- Entrectinib kan mogelijk een invloed hebben op je hartritme of je hartfunctie. Neem contact op met je behandelende arts als je last krijgt van dikke voeten, pijn op de borstkas, ritmestoornissen of als je bij geringe inspanning kortademig bent of meer moet hoesten.
- Het is mogelijk dat je door de inname van entrectinib wazig ziet.
- Door de inname van entrectinib krijg je mogelijk last van duizeligheid, verwardheid, geheugen- en concentratiestoornissen of stemmingswisselingen. Neem contact op met je behandelende arts als je die bijwerkingen ervaart.
- Het is mogelijk dat je huid door de inname van entrectinib heel gevoelig is voor zonlicht, waardoor je sneller kan verbranden. Bescherm je tegen zonlicht en probeer zoveel mogelijk direct en indirect zonlicht te vermijden.



NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie brochure)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:



~~Bloeddruk meten~~



~~Hand- en voetverzorging~~



~~Nagelbescherming~~



NEVENWERKINGEN OPVOLGEN

Volg je klachten goed op, meld en bespreek ze tijdig met je zorgverleners. Op die manier kunnen we je zo goed mogelijk ondersteunen. Je kan je klachten opvolgen aan de hand van een papieren of elektronisch dagboek. Je leest er meer over in de 'Gids bij je oncologische behandeling met tabletten of capsules.'



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie brochure)

Bij jouw behandeling kunnen zich de volgende nevenwerkingen of klachten voordoen:

- Buikloop of diarree
- Huidveranderingen zoals:
 - Droge huid, schilfering, jeuk, huiduitslag
 - ~~Huiduitslag in de vorm van puistjes~~
 - ~~Huidveranderingen aan de handpalmen en voetzolen~~
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en geurveranderingen
- ~~Mondslijmvliesontsteking (afters)~~
- Een verminderd aantal witte bloedcellen
- Een verminderd aantal rode bloedcellen
- ~~Een verminderd aantal bloedplaatjes~~
- ~~Haarveranderingen~~
- Nagelveranderingen
- Verstopping
- ~~Verhoogde bloeddruk~~
- Tintelingen en voos gevoel
- Spier- en gewrichtspijn
- Ongewone vermoeidheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid