

# Je therapie: enfortumab vedotin (Padcev<sup>®</sup>)

## WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel: enfortumab vedotin (doelgerichte therapie). Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

### Hoe werkt de medicatie?

Enfortumab bindt zich aan specifieke eiwitten die aanwezig zijn op de kankercellen. Het geneesmiddel komt de kankercel binnen en geeft een celdodend middel af. Op die manier kan enfortumab de groei van de tumor remmen.

## HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus enfortumab vedotin duurt 4 weken (28 dagen) en omvat 3 opnames voor toediening enfortumab vedotin.

Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 4 weken na dag 1 als de bloedsuitslagen en je algemene toestand het toelaten.

Generieke naam	Merknaam	Dag						Wijze van toediening
		1	2-7	8	9-14	15	16-28	
Enfortumab vedotin	Padvcev <sup>®</sup>	*		*		*		Infuus over 30 minuten

## WAAR WORDT DE THERAPIE TOEGEDIEND?

Je zal de therapie altijd in het ziekenhuis toegediend krijgen. De behandeling kan in het dagziekenhuis gebeuren.

## AANDACHTSPUNTEN EN MOGELIJKE NEVENWERKINGEN VAN ENFORTUMAB VEDOTIN

- Mogelijk heb je door de behandeling last van **misselijkheid, braken of gewichtsverlies**. Ook je smaak kan mogelijk veranderen. Om misselijkheid te voorkomen, krijg je – vóór de toediening van enfortumab vedotin – Ondansetron<sup>®</sup> toegediend via een inspuiting in de bloedbaan. Heb je 's avonds of de volgende dagen nog last van misselijkheid, dan kan je gedurende 3 dagen 1 tablet Zyprexa<sup>®</sup> (olanzapine) 5 mg innemen, bij voorkeur voor het slapengaan. Als deze klachten zich voordoen, bespreek ze dan zeker met je zorgverleners.

- De behandeling met enfortumab vedotin kan een [negatieve invloed hebben op het zenuwstelsel](#). Daardoor krijg je mogelijk last van tintelingen of een voos gevoel aan je vingers en/of tenen. Soms ervaar je een branderig gevoel, spierzwakte of lichte pijn. Het is belangrijk dat je deze klacht meldt aan je zorgverleners.
- Het is mogelijk dat door de behandeling de [bloedsuikerspiegel](#) in je bloed verhoogd is. Meld klachten die kunnen wijzen op een verhoogde bloedsuikerspiegel aan je zorgverleners:
  - veel drinken
  - veel plassen
  - droge, plakkerige mond
  - lusteloosheid, slaperigheid, vermoeidheid
  - minder eetlust
  - misselijkheid
  - vermageren zonder reden
- Het is mogelijk dat je door de behandeling met enfortumab vedotin last krijgt van [huidafwijkingen](#) zoals een droge huid, huiduitslag al dan niet in combinatie met jeuk, roodheid, zwelling. Soms doet zich een ernstige vorm van huidafwijking voor die gepaard gaat met blaarvorming. Krijg je last van huidafwijkingen al dan niet samen met blaarvorming, neem dan onmiddellijk contact op met je behandelende arts, zodat er snel een gepaste behandeling kan gestart worden. Koorts of griepachtige klachten kunnen het eerste teken zijn van een ernstige huidreactie.
- Door de behandeling met enfortumab vedotin is het mogelijk dat je [haren verdunnen](#) of uitvallen.
- Drink voldoende (1,5 tot 2 liter per dag). Op die manier worden de afvalstoffen van de therapie zo snel mogelijk uit de bloedbaan verwijderd.
- Je kan kunsttranen gebruiken als je last krijgt van [droge ogen](#). Meld deze klacht wel aan je zorgverleners.
- Als je last krijgt van toenemende [hoest](#) of als je bij geringe inspanning [kortademig](#) bent, neem dan contact op met je behandelende arts.

Volg je klachten goed op, meld en bespreek ze tijdig met je zorgverleners. Op die manier kunnen we je zo goed mogelijk ondersteunen.