

Je therapie Isa Kd: isatuximab (Sarclisa[®]) – carfilzomib (Krypolis[®]) – dexamethason (hemato)

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS BIJ JE ONCOLOGISCHE BEHANDELING MET TABLETTEN OF CAPSULES.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit drie celremmende geneesmiddelen namelijk isatuximab en carfilzomib (doelgerichte therapie) gecombineerd met dexamethason (corticosteroïde). Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

Hoe werkt de medicatie?

Isatuximab is een antistof die bindt aan een specifiek eiwit op de kankercellen. Door die binding blokkeert isatuximab het signaal aan de kankercellen om te groeien. Daarnaast werkt isatuximab ook in op het immuunsysteem en remt het de groei van de kankercellen.

Carfilzomib verstoort de eiwitafbraak in de cel, waardoor de kankercellen onvoldoende bouwstenen hebben om te groeien.

Dexamethason voorkomt nevenwerkingen. Daarnaast heeft het ook een invloed op de kankercellen.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

- Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. **Eén cyclus duurt vier weken (28 dagen). Het aantal opnames is afhankelijk van de cyclus die je krijgt.** De volgende cyclus start pas als je bloedsuitslagen en je algemene toestand dit toelaten.
- **Isatuximab** wordt tijdens cyclus 1 wekelijks toegediend. Vanaf cyclus 2 wordt isatuximab om de twee weken toegediend.
- **Carfilzomib** wordt gedurende drie weken wekelijks toegediend gevolgd door één week rust.

		Dag								Toedieningswijze
		1	2-7	8	9-14	15	16-21	22	23-28	
Isatuximab (Sarclisa[®])	Cyclus 1	•		•		•		•		Dag 1: infuus over 3,5 u Dag 8: infuus over 2 uur Vanaf dag 15: infuus over 1,5 uur
	Cyclus 2 en volgende	•				•				Infuus over 1,5 uur
Carfilzomib (Krypolis[®])	Cyclus 1 en volgende	•		•		•				Infuus over 30 minuten
Ondersteunende medicatie										
Dexamethason . . . mg Cetirizine (Zyrtec [®]) 10 mg Paracetamol (Dafalgan [®]) 1 g	Cyclus 1	•		•		•		•		30 minuten tot 4 uur vóór toediening isatuximab en carfilzomib bij het eten
	Cyclus 2 en volgende	•		•		•				

ONDERSTEUNENDE MEDICATIE

Aciclovir (Zovirax[®]) neem je tweemaal per dag. Deze medicatie beschermt je tegen virale infecties, zoals gordelroos (zona). De dosis is afhankelijk van je nierfunctie.

Algemene richtlijnen rond de inname, bewaring en manipulatie en wat je het best doet als zich bepaalde situaties voordoen, kan je vinden in de Gids bij je oncologische behandeling met tabletten of capsules.

WAAR WORDT DE THERAPIE TOEGEDIEND?

De behandeling kan in het dagziekenhuis gebeuren. Overnachting is dan niet nodig.

AANDACHTSPUNTEN BIJ ISATUXIMAB - CARFILZOMIB EN DEXAMETHASON

- Het is belangrijk dat je voldoende (1,5 liter) drinkt op de dag van en de dag na de toediening van carfilzomib.
- Er kan zich mogelijk een **infuusreactie** voordoen tijdens en na de eerste toediening van carfilzomib en

isatuximab. Om dat te voorkomen neem je 30 minuten tot 4 uur vóór de toediening **ondersteunende medicatie**, namelijk **dexamethason**, **cetirizine (Zyrtec®) 10 mg** en **paracetamol (Dafalgan®) 1 g**. Om die reden wordt Isatuximab de eerste twee toedieningen ook trager toegediend.

Een infuusreactie kenmerkt zich door huiduitslag, al dan niet in combinatie met jeuk (eventueel over het ganse lichaam), een gevoel van benauwdheid, prikkelhoest, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Soms gaat een reactie gepaard met een prikkelhoest, een gevoel van misselijkheid of met overmatig transpireren. Het is belangrijk dat je dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan de verpleegkundige of arts, zodat er vlug en adequaat kan worden gereageerd.

- De inname van **corticosteroiden** (namelijk dexamethason) kan bijwerkingen veroorzaken zoals maaglast, slaapmoeilijkheden, stemmingswisselingen, verhoogde eetlust. Toch is het belangrijk dat je deze medicatie inneemt zoals het staat aangegeven of werd uitgelegd. De medicatie is immers belangrijk voor je behandeling. Bespreek deze klachten met je zorgverleners.
- Mogelijk krijg je last van kortademigheid of een infectie van de luchtwegen. Als je dit ervaart aarzel dan niet je behandelende arts te contacteren.



NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie brochure)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:



Bloeddruk meten



Hand- en voetverzorging



Nagelbescherming



NEVENWERKINGEN OPVOLGEN, TIJDIG MELDEN EN BESPREKEN

Volg je klachten goed op, meld en bespreek ze tijdig met je zorgverleners. Je kan je **klachten opvolgen** aan de hand van een **papiere of elektronisch dagboek**. Je leest er meer over in de gids. Ervaar je ernstige of aanhoudende klachten of je bent ongerust over bepaalde klachten, aarzel dan niet je zorgverleners in het ziekenhuis of je huisarts te contacteren. 'Alarmsignalen' en **contactgegevens** vind je in de gids.



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie brochure)

Bij jouw behandeling kunnen zich de volgende nevenwerkingen of klachten voordoen:

- Buikloop of diarree
- Huidveranderingen zoals:
 - Droge huid, schilfering, jeuk, huiduitslag
 - ~~Huiduitslag in de vorm van puistjes~~
 - ~~Huidveranderingen aan de handpalmen en voetzolen~~
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en reukveranderingen
- ~~Mondlijmvliesontsteking (afters)~~
- Een verminderd aantal witte bloedcellen
- Een verminderd aantal rode bloedcellen
- Een verminderd aantal bloedplaatjes
- Haarveranderingen
- ~~Nagelveranderingen~~
- Verstopping
- ~~Verhoogde bloeddruk~~
- Tintelingen en voos gevoel
- Spier- en gewrichtspijn
- Ongewone vermoeidheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Invloed op de seksualiteit