

Je therapie: SIRI - Teysuno[®] (irinotecan - tegafur/gimeracil/oteracil)

(DIO)


DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS BIJ JE ONCOLOGISCHE BEHANDELING MET TABLETTEN OF CAPSULES.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit twee celremmende geneesmiddelen, namelijk Teysuno[®] (doelgerichte therapie) en irinotecan (cytostaticum). Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

- Je komt naar het dagziekenhuis voor een bloedafname, een klinisch onderzoek, de toediening van irinotecan en een nieuwe voorraad capsules. Je neemt de capsules dan thuis in.
- Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt 4 weken (28 dagen) en omvat 2 opnames voor toediening chemotherapie.
- Tijdens één cyclus wordt **irinotecan (Campto[®])** op **dag 1 en dag 15** toegediend en neem je **Teysuno[®] dagelijks in gedurende 21 dagen** gevolgd door één week rust. De volgende cyclus start in principe 4 weken na dag 1, als je bloedsuitslagen en je algemene toestand het toelaten.
- Teysuno[®] bestaat in capsules van 15 en 20 mg. Je arts of verpleegkundige vertelt je welke dosis je dagelijks moet nemen. Afhankelijk van de ernst van de nevenwerkingen die je ondervindt, is een dosisverlaging mogelijk.

Generieke naam	Merksnaam	Dag						Wijze van toediening
		1	2-14	15	16-21	22	23-28	
Irinotecan	Campto [®]	•		•				Infuus over 90 minuten
Teysuno [®] (tegafur/gimeracil/oteracil)								
..... mg ochtend			•	•	•	•		
..... mg avond		•	•	•	•			

Inname

- Teysuno[®] wordt **twee keer per dag** ingenomen met 12 uur tussen beide innames.
- Teysuno[®] wordt **op een lege maag** ingenomen. Dit betekent **1 uur vóór of 1 uur na de maaltijd**.
- Teysuno[®] wordt ingenomen **van dag 1 's avonds tot en met dag 22 's morgens** gevolgd door 1 week rust.

Wat als?

Als je een dosis Teysuno[®] bent vergeten, **sla je de vergeten dosis over**. Neem je volgende dosis op het geplande tijdstip.

Algemene richtlijnen rond de inname, bewaring en manipulatie en wat je het best doet als zich bepaalde situaties voordoen, kan je vinden in de Gids bij je oncologische behandeling met tabletten of capsules.

AANDACHTSPUNTEN BIJ IRINOTECAN - TEGAFUR/GIMERACIL/OTERACIL (TEYSUNO®)

- Voor elke toediening van irinotecan krijg je een inspuiting met atropine omdat **irinotecan** soms kan leiden tot een acute reactie namelijk een **acuut cholinerg syndroom**, met zweten, speekselvloed, loopneus, buikpijn of diarree tot gevolg. Atropine helpt om die reactie te voorkomen. Meld het meteen aan je zorgverleners als je die symptomen toch nog ervaart.
- Mogelijk krijg je door de inname van Teysuno® last van droge, tranende ogen, een ontsteking aan de ogen of wazig zicht. Bespreek deze klacht met je behandelende arts.
- Het kan gebeuren dat je door de inname van Teysuno® last krijgt van duizeligheid en hoofdpijn.



NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie gids)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:




Bloeddruk meten



Hand- en voetverzorging



Nagelbescherming



NEVENWERKINGEN OPVOLGEN, TIJDIG MELDEN EN BESPREKEN

Volg je klachten goed op, meld en bespreek ze tijdig met je zorgverleners. Je kan je **klachten opvolgen** aan de hand van een **papiere of elektronisch dagboek**. Je leest er meer over in de gids. Ervaar je ernstige of aanhoudende klachten of je bent ongerust over bepaalde klachten, aarzel dan niet je zorgverleners in het ziekenhuis of je huisarts te contacteren. 'Alarmsignalen' en **contactgegevens** vind je in de gids.



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie gids)

Bij jouw behandeling kunnen zich de volgende nevenwerkingen of klachten voordoen:

- Buikloop of diarree *na gemiddeld 5 dagen*
- Huidveranderingen zoals:
 - Droge huid, schilfering, jeuk, huiduitslag *mogelijke verkleuring van de huid*
 - ~~Huiduitslag in de vorm van puistjes~~
 - Huidveranderingen aan de handpalmen en voetzolen
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en geurveranderingen
- Mondslijmvliesontsteking (afters)
- Ongewone vermoeidheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid
- Een verminderd aantal witte bloedcellen
- Een verminderd aantal rode bloedcellen
- Een verminderd aantal bloedplaatjes
- Haarveranderingen *haarverlies*
- Nagelveranderingen
- Verstopping
- ~~Verhoogde bloeddruk~~
- Tintelingen en voos gevoel
- Spier- en gewrichtspijn