

# Je therapie: tremelimumab - durvalumab

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS BIJ JE BEHANDELING MET IMMUNOTHERAPIE.

## WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit twee celremmende geneesmiddelen (immunotherapie), namelijk tremelimumab en durvalumab. Tremelimumab en durvalumab helpen je immuunsysteem om kankercellen beter te herkennen en aan te vallen. Daarnaast kunnen er andere geneesmiddelen voorgeschreven worden.

Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

## HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt vier weken (28 dagen) en omvat één dagopname voor immunotherapie. Dag 1 is altijd de eerst dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe vier weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en je algemene toestand dit toelaten.

Tremelimumab wordt enkel tijdens de eerste cyclus samen met durvalumab gegeven. Vanaf de 2e cyclus krijg je alleen durvalumab toegediend.

Generieke naam	Merknaam	Dag		Wijze van toediening
		1	2-28	
Tremelimumab	Imjudo®	•		Infuus over 1 uur, enkel tijdens de 1e cyclus
Durvalumab	Imfinzi®	•		Infuus over 1 uur

## WAAR WORDT DE THERAPIE TOEGEDIEND?

De behandeling kan in het dagziekenhuis gebeuren. Overnachting is niet nodig.

## AANDACHTSPUNTEN BIJ TREMELIMUMAB - DURVALUMAB

- Mogelijk doet zich een **infuusreactie** voor, tijdens of na de toediening van tremelimumab en/of durvalumab. Een infuusreactie kenmerkt zich door huiduitslag al dan niet in combinatie met jeuk (eventueel over het hele lichaam), een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Soms gaat een reactie gepaard met een gevoel van misselijkheid of met overmatig transpireren. Het is belangrijk dat je dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan de verpleegkundige of arts, zodat er vlug en adequaat kan worden gereageerd.
- Het is erg belangrijk dat een auto-immuunreactie tijdig wordt vastgesteld en behandeld!



**Welke klachten kunnen wijzen op een auto-immuunreactie, vind je in de gids. Neem contact op met je behandelende arts als je klachten ervaart die hierop kunnen wijzen.**

**Pas als een auto-immuunreactie is uitgesloten, kan je veilig aan de slag om klachten te vermijden.**



## NEVENWERKINGEN OPVOLGEN, TIJDIG MELDEN EN BESPREKEN

Volg je klachten goed op, meld en bespreek ze tijdig met je zorgverleners. Je kan je klachten opvolgen aan de hand van een [papieren of elektronisch dagboek](#). Je leest er meer over in de gids. Ervaar je ernstige of aanhoudende klachten of je bent ongerust over bepaalde klachten, aarzel dan niet je zorgverleners in het ziekenhuis of je huisarts te contacteren. 'Alarmsignalen' en [contactgegevens](#) vind je in de gids.



## MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie gids)

Bij jouw behandeling kunnen zich ook volgende nevenwerkingen of klachten voordoen.

- Buikloop of diarree
- Huidveranderingen, huiduitslag
- Ongewone vermoeidheid
- Misselijkheid
  
- Invloed op seksualiteit en vruchtbaarheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet