



Het verblijf van je kind op de afdeling kinderhemato- oncologie

informatie voor patiënten

INLEIDING	3
ALGEMENE RICHTLIJNEN	5
• Het nemen van medicatie	
• Mondzorg	
• Koorts	
• Obstipatie	
• Pijn	
• Bloedbeeld	
• Contact met urine en stoelgang	
• Slapen	
• Andere richtlijnen	
RICHTLIJNEN VOOR INFECTIEPREVENTIE	14
• Leefregels	
• Richtlijnen om infecties te helpen voorkomen	
• Tekenen die kunnen duiden op infectie	
RICHTLIJNEN VOOR VOEDING	20
CONTACTGEGEVENS	21
VRAGEN OF BEMERKINGEN	22

Geconfronteerd worden met een ernstige aandoening bij je kind roept een heleboel vragen op. Op de afdeling kinderhemato-oncologie staat het hele team klaar om op die vele praktische, maar ook andere vragen te antwoorden. We proberen jou en je kind op alle mogelijke vlakken te ondersteunen en te begeleiden.

De artsen-assistenten maken, samen met de superviserende arts, dagelijks hun ronde. De artsen staan, net zoals de verpleegkundigen, altijd ter beschikking om vragen te beantwoorden over de ziekte en behandeling van je kind. Je kunt ook altijd een afspraak maken op een ander tijdstip.

De zorgcoördinator stelt het behandelingsschema op en plant de nodige onderzoeken en afspraken in. Je kunt bij de coördinator terecht voor meer uitleg in verband met de praktische uitvoering van de therapie en van de onderzoeken.

Er zijn apothekers verbonden aan onze afdeling. Bij hen kun je altijd terecht met al je vragen over de te nemen medicatie. Bij elk ontslag overlopen zij opnieuw de te nemen medicatie.

Bij de start van je behandeling komt ook de tandarts langs. Als dat nodig is, start de tandarts een behandeling op. De tandarts zal je uitgebreid informatie geven over een goede mondhygiëne en dat ook opvolgen tijdens je behandeling.

Er zijn psychologen aanwezig die jou en je kind ondersteunen en begeleiden in deze moeilijke periode.

De sociaal werkers helpen bij het vele papierwerk. Voor alle atesten en administratieve ondersteuning kun je bij hen terecht.



Bij de diëtist kun je terecht met al je vragen rond voeding. De diëtist geeft je informatie over alle voedingsproblemen, die zich kunnen voordoen.

De kinesitherapeuten en ergotherapeuten begeleiden je kind bij de fysieke revalidatie.

Bij de muziektherapeut kunnen de kinderen hun boosheid en frustraties, maar ook hun positieve gevoelens kwijt in het maken van muziek. De therapeut komt op de kamer langs of musiceert met de kinderen in de muziekkamer.

Een veilige haven op de afdeling is 'de bonte specht', een speelzaal waar de kinderen terechtkunnen voor allerlei activiteiten. Dit is hún domein: artsen, verpleegkundigen en ouders betreden het zo weinig mogelijk. Bij isolatie is er een aanbod in de kamer voorzien.

Ook het schoolwerk verliezen we niet uit het oog. De ziekenhuis-schoon zal tijdens deze moeilijke periode zorgen voor het onderwijs van je kind en dat in samenspraak met de thuishooshoon.

Soms is het nodig dat er thuis zorgondersteuning, zoals thuisverpleging, wordt voorzien. De thuiszorgequipe zorgt daarvoor.

Blijf niet met vragen zitten, noteer ze en bij de eerste gelegenheid kun je gerust een antwoord vragen.

Je kunt ook altijd terecht bij de verpleegkundigen, die contact zullen opnemen met de nodige mensen.

De afdeling kinderhemato-oncologie,
Hospitalisatie kinderen B

ALGEMENE RICHTLIJNEN



Het nemen van medicatie

Heel wat kinderen vinden pillen slikken moeilijk. Vaak is de reden daarvoor dat ze het nooit eerder gedaan hebben. Toch moet je kind op een gegeven moment pillen leren te slikken,

want die medicijnen maken deel uit van de behandeling. We starten daar al heel snel mee en ook jullie als ouders kunnen daarbij helpen.

Enkele suggesties

- ❁ Blijf zelf rustig en positief.
- ❁ Vertel je kind waarom het de pillen moet innemen.
- ❁ Vertel eerlijk dat iets vies smaakt. Meng liever geen medicijnen door eten of drinken. De smaak van de pilletjes zal dan geassocieerd worden met eten.
- ❁ Doe één keer rustig voor hoe een pil wordt ingeslikt: leg een tablet goed achter op de tong, neem een slok water en slik het tablet door. Laat je kind ook na de inname even drinken.



- ❁ Het leren slikken van pillen gebeurt best in kleine stapjes. Je kunt je kind eerst laten oefenen met hele kleine snoepjes. Als dat zonder problemen verloopt, neem je een grotere maat tot je komt tot de grootte van de pil die je kind moet innemen. Die oefeningen moeten van korte duur zijn (5 tot 10 minuten) en moeten enkele dagen worden volgehouden.
- ❁ Vermijd zoveel mogelijk afleiding en onderbrekingen tijdens het innemen van de medicijnen.
- ❁ Als je kind gaat kokhalzen of braken, blijf dan kalm. Geef het even tijd om te bekomen. Wanneer je kind binnen de 30 minuten na de inname braakt, moet je het medicijn opnieuw geven. Verwittig dan altijd de verpleegkundige.
- ❁ Prijs je kind uitgebreid als de pilinname vlot verlopen is.
- ❁ De inname van sommige pillen gaat gemakkelijker als ze in twee of in vier gebroken worden. Soms kunnen pilletjes toch fijner gemaakt worden en met een lepeltje ingenomen worden met wat yoghurt, ijs of appelmoes, of ze kunnen in een vloeistof met wat grenadine worden opgelost. Verwittig het kind daarvan.
- ❁ Zorg voor iets leuks als beloning, bijvoorbeeld een sticker of een speeltje.
- ❁ Soms bestaat het medicijn ook in vloeibare vorm of wordt het als capsule geleverd. Vloeibare medicijnen kun je met een lepel of een maatbekertje geven of ze kunnen met een spuitje in de mond gespoten worden. Je kind kan ze 'puur' innemen of aangelengd met water en/of grenadine.

Als je bij je kind moeilijkheden opmerkt bij het innemen van pillen, aarzel zeker niet hulp te vragen. Ook de psychologen van onze afdeling kunnen u en uw kind daarin bijstaan.

Pillen slikken gaat in sommige situaties ook moeilijk door pijnlijke wondjes in de mond of de keel. Verwittig in dat geval altijd de verpleegkundige.

Geef je kind geen andere medicatie zoals vitaminen, homeopathische middelen ... voor je dat besproken hebt met je behandelende arts. In bepaalde preparaten kunnen namelijk producten zitten die het best niet gecombineerd worden met de chemotherapie.

Mondzorg

Een goede mondverzorging is absoluut noodzakelijk.

Via de slijmvliezen van de mond kunnen allerlei kiemen in de bloedbaan komen en die kiemen kunnen dan voor ernstige infecties zorgen.

Enkele adviezen

- ★ Laat je kind tweemaal per dag de tanden grondig poetsen met een zachte of medium tandenborstel. Ook als je kind aftjes heeft, blijft poetsen heel belangrijk. Dat kan dan ook met een sponsje op een stokje.
- ★ Vervang elke maand de tandenborstel en zet hem omgekeerd in het voorziene bekertje.



Koorts

De afspraken bij koorts zijn als volgt:

- Wanneer eenmalig 38 °C gemeten wordt, wacht dan 1 uur zonder een koortswerend middel te geven.
- Meet na 1 uur opnieuw. Als de temperatuur gezakt is tot onder 38 °C, wacht dan af tot de volgende koortspiek. Is de temperatuur 38 °C of hoger? Verwittig dan het ziekenhuis.
- Bij koorts hoger dan 38 °C: neem onmiddellijk contact op met het ziekenhuis. Let op: geef pas een koortswerend middel als de arts aangeeft dat het mag.



Indien nodig wordt je kind opgenomen in het ziekenhuis om intraveneuze antibiotica te krijgen. Die opname duurt minstens drie dagen. Als koortswerende medicatie mag je kind enkel paracetamol zoals Dafalgan® of Perdolan® krijgen, maar zeker **geen** Brufen®, Junifen® of Aspirine®.

Obstipatie

Als je kind last heeft van verstopping (obstipatie), zorg er dan voor dat je kind voldoende drinkt.

Eventueel starten we met het toedienen van een laxerend middel (Duphalac® siroop, zakjes Forlax® of Movicol®). Het is belangrijk dat die behandeling lang genoeg wordt voortgezet (vraag naar de stoelgangkaart).

Vooraf na de toediening van bepaalde medicatie zoals Vincristine® kan gedurende enkele dagen wat obstipatie optreden.

De hierboven beschreven maatregelen zijn meestal voldoende, maar hou in elk geval het ontlastingspatroon van je kind in de gaten en waarschuw ons bij aanhoudende problemen.

Pijn

Er zijn verschillende redenen waarom je kind pijn kan hebben:

- ★ de ziekte of de tumor zelf
- ★ nevenwerking van de medicatie: buikpijn, kaakpijn of spierpijn als gevolg van de behandeling, bijvoorbeeld na het toedienen van Vincristine® (chemotherapeutica)
- ★ ontstekingen en infecties in de behandelingsperiode
- ★ uitgesproken stomatitis (ontsteking van het mondslijmvlies)
- ★ buikpijn en diarree na chemotherapie

De pijn moet adequaat worden aangepakt. Er wordt eerst gestart met paracetamol. Als de pijn daarmee niet onder controle is, kan er overgegaan worden op contramal/tradonal in druppelvorm. Als de pijn niet gecontroleerd kan worden met medicatie langs de mond, zal er overgeschakeld worden op intraveneuze medicatie (via een infuus). Dat gebeurt altijd in overleg met de behandelende arts. Opname op de afdeling is dan aangewezen.

Bloedbeeld

Chemo- en radiotherapie werken in op de sneldelende cellen in ons lichaam. Niet alleen de zieke cellen worden aangetast, maar ook de gezonde cellen (bijvoorbeeld de haarcellen, met mogelijk haaruitval als gevolg). Ook onze bloedcellen worden regelmatig vernieuwd en zijn dus sneldelend. In ons beenmerg worden voortdurend nieuwe bloedcellen aangemaakt. Door de therapie wordt die aanmaak onderdrukt.



In het beenmerg worden drie soorten bloedcellen aangemaakt:

Rode bloedcellen: RBC

In de rode bloedcellen zit het hemoglobine (Hb) met een normale waarde van >12 mg/dl.

Het hemoglobine is verantwoordelijk voor het zuurstoftransport naar de verschillende weefsels. Als we te weinig RBC/hemoglobine hebben, voelen we ons moe en slap en hebben we hoofdpijn. Dat kan verholpen worden door bloed bij te geven (bloedtransfusie). Een transfusie wordt gegeven als het hemoglobinegehalte < 7 mg/dl is. De toediening van bloed duurt tussen twee en vier uur.

Bloedplaatjes: BP

Bloedplaatjes of trombocyten hebben een normale waarde van $> 100\ 000$ à $150\ 000$ /ml.

De bloedplaatjes zijn verantwoordelijk voor een goede bloedstolling. Als er te weinig bloedplaatjes zijn, kunnen spontane bloedingen optreden, zoals neusbloedingen, tandvleesbloedingen of onderhuidse bloedingen, grote blauwe plekken of treden er kleine puntvormige bloedingen op (petechieën). Dat tekort kan opgevangen worden door bloedplaatjes bij te geven. Bloedplaatjes worden bijgegeven als er minder dan $10\ 000$ /ml zijn. De toediening duurt ruim een halfuur.

Witte bloedcellen: WBC of leucocyten

Witte bloedcellen hebben een normale waarde tussen 5 000 en 15 000/ml.

De witte bloedcellen verdedigen ons tegen infecties. Een tekort aan witte bloedcellen is gevaarlijk. Daarom is het zinvol om een aantal regels die de kans op een infectie verkleinen, in acht te nemen (zie ook richtlijnen in verband met infectiepreventie). Als het aantal WBC minder dan 1 000/ml is (aplasie) en je kind heeft koorts ($> 38,5^{\circ}\text{C}$) dan moet het opgenomen worden. Witte bloedcellen kunnen niet met een transfusie worden toegediend.

Het effect van de chemotherapie op het bloedbeeld treedt meestal op tussen zeven à tien dagen na de toediening ervan. De tussentijdse controles van het bloedbeeld gebeuren in overleg met de ouders en de behandelende arts, bij de huisarts, de kinderarts of op de dagzaal. De poortkatheter wordt in het algemeen niet gebruikt voor die tussentijdse controles (meestal een vingerprik of een prikje in de arm).

Contact met urine en stoelgang

Na het geven van chemotherapie of een onderzoek waarbij isotopen worden gebruikt (botscan, PET-scan, MIBG-scan) moet rechtstreeks contact met stoelgang en urine vermeden worden. Lichaamseigen stoffen (zoals urine, stoelgang, enzovoort) kunnen na chemotherapie of bepaalde onderzoeken met radioactieve stoffen namelijk giftig zijn. Gebruik daarom tot één week na het stoppen van de chemotherapie handschoenen bij contact met stoelgang of urine van je kind. Hou daar thuis rekening mee. Gebruik bijvoorbeeld ook handschoenen bij het verversen van luiers.



Enkele raadgevingen

- ✿ Wees voorzichtig met urine en stoelgang.
- ✿ Laat je kind altijd zittend plassen op het toilet om spatten te voorkomen.
- ✿ Spoel het toilet altijd tweemaal door met gesloten deksel.
- ✿ Was je handen en die van je kind grondig na gebruik van het toilet.
- ✿ Wees ook voorzichtig met het opruimen van braaksel. Doe zo nodig plastic handschoenen aan.
- ✿ Zwangere mama's moeten nog voorzichtiger omgaan met urine, stoelgang en braaksel en dragen in dat geval het best zoveel mogelijk plastic handschoenen.

Slapen

Ondanks het ernstig ziek zijn van je kind, adviseren wij sterk dat kinderen en jongeren in hun eigen bed en in hun eigen kamer slapen. Dat is niet alleen belangrijk vanuit hygiënisch oogpunt, maar evenzeer vanuit het pedagogische aspect. Het wordt dan ook sterk afgeraden kinderen tussen de ouders in te laten slapen.



Andere richtlijnen

Inentingen

Tijdens de behandeling met chemotherapie kun je je kind beter niet laten inenten met een levend vaccin (bijvoorbeeld mazelen, bof, rode hond). Dat kan je kind ernstig ziek maken. Het is bovendien niet zeker of je kind voldoende antistoffen zal aanmaken na de vaccinatie.

Na het stoppen met chemotherapie kan je kind, in overleg met de arts, na een half jaar opnieuw worden ingeënt volgens het vaccinatieschema. Het is aan te raden de overige gezinsleden wel een griepvaccin te geven in het najaar.

Ondersteunende medicatie

Door de behandeling is de weerstand van je kind sterk vermindert. De bacteriën, gisten en schimmels die ieder mens normaal bij zich draagt, kunnen bij zo'n sterk verminderde weerstand infecties veroorzaken. Daarom worden sommige kinderen preventief behandeld met antibiotica en / of antischimmelmedicatie. De behandelende arts gaat na of dat bij jouw kind nodig is. Bovendien moet je kind, indien nodig, gedurende de hele therapie Bactrim® of Eusaprim® in pil- of siroopvorm innemen om de longen te beschermen.



RICHTLIJNEN VOOR INFECTIEPREVENTIE

Omwille van de ziekte en de behandeling kan je kind zich momenteel niet zo goed beschermen tegen ziekteverwekkende kiemen. De meeste infecties bij kinderen met een verminderde afweer worden veroorzaakt door kiemen die aanwezig zijn in het eigen lichaam. Thuis zijn de normale hygiënische maatregelen voldoende. Dat betekent vooral dat je kind en alle huisgenoten goed de handen moeten wassen met zeep. Naast lichaamseigen kiemen kunnen ook kiemen van buitenaf worden overgedragen, bijvoorbeeld door voedsel of sociaal contact. Hou je aan enkele leefregels om infecties zoveel mogelijk te voorkomen, maar probeer er ook echt voor te zorgen dat je kind samen met je gezin het leven zo normaal mogelijk kan voortzetten, ondanks de moeilijke diagnose en therapie.

Leefregels

School

Kinderen met kanker mogen in principe gewoon naar de kinderopvang of naar school gaan. Praktisch blijkt dat niet altijd haalbaar, omdat je kind in de kinderopvang ingeschreven moet worden en omdat op regelmatige basis naar school gaan meestal niet kan. Bij de meeste kinderen wordt daarom thuisonderwijs en Bednet opgestart.

Als je kind naar school kan en wil gaan, dan mag dat. Schoolbezoek is voor de ontwikkeling van je kind van groot belang. Breng wel de leerkracht en de directeur van de school op de hoogte van de ziekte van je kind. Voor leerkrachten en medeleerlingen is er tegenwoordig veel informatie beschikbaar in de vorm van boeken, brochures en leskoffers. Als dat nodig is, kunnen ook de medewerkers van onze ziekenhuisschool contact opnemen met de school van je kind. Doen in de klas van je kind de waterpokken de ronde, dan moet de school je contacteren. Of je kind dan nog naar school kan gaan, is afhankelijk van zijn immuniteit tegen waterpokken.

Je kind mag in principe meedoen met alle schoolactiviteiten, ook schoolreisjes. Uitstapjes naar bijvoorbeeld toeristische attracties vormen geen probleem. Kinderen zonder neutropenie kunnen in principe aan alle activiteiten deelnemen. Het wordt aangeraden om drukke openbare plaatsen, slecht geventileerde ruimtes en het openbaar vervoer te vermijden.

Sport

Als zijn conditie het toelaat, dan mag je kind elke sport beoefenen. In perioden van trombocytopenie ($< 50\ 000 / \mu\text{L}$) moeten contactsporten worden vermeden. Zwemmen is toegestaan in (tropische) zwembaden, maar niet in zee, rivieren of meren. Met de voeten in zee wandelen mag wel. Het gebruik van warme bubbelbaden wordt afgeraden. Zwemmen mag met een PAC, tenzij de PAC is aangeprikt, maar niet met een Hickman of Broviac (getunnelde katheter). Spelen op het strand mag ook. Spelen in een zandbak thuis kan ook, als die afgedekt wordt wanneer er niet in gespeeld wordt.

Vakantie

Kies bij voorkeur een vakantiebestemming in een land met goede en goed bereikbare medische voorzieningen. Er kan een brief meegegeven worden waarin de hoofdzaken van de ziektegeschiedenis vermeld staan. Vermijd dat je kind uitgebreid zonnebaadt en bedek de huid zoveel mogelijk met bijvoorbeeld een T-shirt en pet. Gebruik ook een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor. Een reis met het vliegtuig vormt geen probleem.

Huisdieren

Bepaalde huisdieren zijn toegestaan. Patiënten mogen de kattenbak en / of het konijnenhok niet schoonmaken in verband met infectiegevaar (zie ook de brochure 'Wat met huisdieren als je kind kanker heeft?').



Richtlijnen om infecties te helpen voorkomen

- ✿ Een goede dagelijkse lichaamshygiëne is en blijft belangrijk.
- ✿ Was de handen frequent met een gewone, zachte zeep en doe dat zeker vóór de maaltijden en na elk toiletbezoek.
- ✿ Houd de nagels kort en verwijder zichtbaar vuil.
- ✿ Poets de tanden tweemaal per dag. Gebruik een individuele zachte of medium tandenborstel en vervang die maandelijks. Gebruik ook een eigen beker om de mond te spoelen. Wordt de mond pijnlijk, controleer dan op blaasjes (afters). Raadpleeg in dat geval de huisarts of behandelende arts (zie ook de brochure 'Mondzorg').
- ✿ Loop niet op blote voeten om wondjes te voorkomen. Voorzie altijd slippers, pantoffels of ander schoeisel. Laat het gezin solidair zijn.
- ✿ Let op voor de zon: door de medicatie is je kind extra gevoelig voor zonnebrand. Gebruik dus een bescherming met hoge factor en blijf niet te lang in de zon. Gebruik petjes en sjaaltjes als je kind naar buiten gaat.
- ✿ Spelen op het strand mag. Spelen in een zandbak thuis kan ook, als die afgedekt wordt wanneer er niet in gespeeld wordt.
- ✿ Verlucht de kamers regelmatig.

- ❁ Is een van de andere gezinsleden ziek, waarschuw dan tijdig je huisarts en beperk zoveel mogelijk rechtstreekse contacten (niezen, hoesten, kussen). Zieke broers of zussen hoeven het huis niet te verlaten.
- ❁ Maak de andere kinderen er attent op dat zij niet van elkaars beker drinken.
- ❁ Gebruik voor dranken elke dag een nieuwe fles. Laat je kind niet drinken van drankfontein en kraantjeswater.
- ❁ Knuffels was je bij voorkeur een keer per week.
- ❁ Vermijd rechtstreeks contact met huisdieren. Ze mogen bijvoorbeeld het gezicht van je kind niet likken. Was altijd goed de handen na het spelen met je huisdier.
- ❁ Huisdieren hoeven niet weg, maar mogen niet in de slaapkamer en keuken komen. Je kind mag de kattenbak en / of het konijnenhok niet schoonmaken.
- ❁ In huis zijn de gewone poetsbeurten voldoende om het huis hygiënisch te houden. Je hoeft geen speciale detergenten te kopen. Het sanitair mag wel extra aandacht krijgen.
- ❁ Ververs de lakens van het bed één keer per week. Verander ook wekelijks (of sneller indien nodig) van pyjama.
- ❁ Roken in huis is af te raden.
- ❁ Ga regelmatig wandelen, maar beperk dat als het regent of mistig is.



- ❁ Bezoek is heel leuk voor je kind. Vraag je bezoeker om eerst even te bellen om na te gaan of niemand van hen ziek is.



- ❁ Vriendjes die regelmatig op bezoek komen, leg je gerust de belangrijkste hygiënische richtlijnen uit.
- ❁ Vermijd contact met mensen die ziek zijn.
- ❁ Vermijd drukke plaatsen of slecht verluchte ruimtes.
- ❁ Ga naar de winkel op minder drukke momenten.
- ❁ Ga naar de bioscoop tijdens schooldagen.

Tekenen die kunnen duiden op infectie

- ★ Koorts > 38°C
- ★ Hoesten of snelle ademhaling
- ★ Diarree
- ★ Maag- of buikpijn
- ★ Hoofdpijn
- ★ Keelpijn
- ★ Oorpijn
- ★ Zweetjes, roodheid of pijn rond de anus
- ★ Pijn bij het plassen
- ★ Huiduitslag, blaren of rode, pijnlijke plekken



Wanneer je kind koorts ontwikkelt van 38°C of meer langer dan een uur (onder de arm te nemen), neem dan altijd contact op met de afdeling.



RICHTLIJNEN VOOR VOEDING

Om te voorkomen dat je kind tijdens de behandelingsperiode infecties oploopt door de inname van voedsel, moet je volgende richtlijnen in acht nemen. De diëtist komt daarvoor langs op de kamer. Lees meer over voedingsrichtlijnen in een aparte brochure. Vraag een exemplaar aan de diëtist.

AANKOOP

- X Vermijd beschadigde verpakkingen.
- X Controleer de houdbaarheidsdatum.
- X Vervoer je gekoelde en diepgevroren aankopen zo snel mogelijk.

BEWAREN EN BEREIDEN

- X Bewaar en bereid maaltijden in een hygiënische omgeving.
- X Hou rauw en bereid voedsel van elkaar gescheiden.
- X Bewaar bereide producten in gesloten potjes.
- X Verhit vlees, vis, gevogelte en eieren door en door.

RISICOVOL VOEDSEL

- X Rauw vlees, vis, gevogelte en eieren en alle koude bereidingen die daarmee gemaakt worden
- X Schimmelkazen en niet-gepasteuriseerde kazen (kijk op de verpakking)
- X Onbehandelde noten

HYGIËNE

- X Was altijd je handen en droog ze goed af voor het bereiden, opdienen en eten van de maaltijd.
- X Gebruik proper keukensmateriaal, verschoon hand- en vaatdoeken dagelijks.

CONTACTGEGEVENS VAN DE DIENST KINDERHEMATO-ONCOLOGIE

Zorgcoördinator tel. 016 34 06 41

Verpleegafdeling tel. 016 34 58 07

tel. 016 34 58 08

Dagziekenhuis tel. 016 34 31 41

Thuiszorg tel. 016 34 33 42





© februari 2020 UZ Leuven

Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie

Deze tekst werd opgesteld door de dienst kinderhemato-oncologie in samenwerking met de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700018.

Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via communicatie@uzleuven.be.

Verantwoordelijke uitgever


UZ Leuven

Herestraat 49

3000 Leuven

tel. 016 33 22 11

www.uzleuven.be

 mynexuzhealth



Raadpleeg uw medisch dossier
via www.mynexuzhealth.be
of download de app

