







UW THERAPIE: CAPECITABINE (XELODA®) – LAPATINIB (TYVERB®)

Van / tot /

Dosis

Xeloda®

... mg (’s morgens)		... x tabletten 500 mg	
		... x tabletten 150 mg	
... mg (’s avonds)		... x tabletten 500 mg	
		... x tabletten 150 mg	

Tyverb®

..... mg (bij voorkeur ’s morgens)		... x tabletten 250 mg	
---------------------------------------	---	------------------------	---

Richtlijnen

- ✗ Xeloda® altijd bij de maaltijd innemen. Altijd twaalf uur laten tussen beide innames van Xeloda®, bijvoorbeeld ’s ochtends om 8 uur en ’s avonds om 20 uur.
- ✗ Tyverb® altijd op een lege maag innemen, dit betekent minstens één uur voor of één uur na de maaltijd en elke dag rond hetzelfde tijdstip, bij voorkeur ’s ochtends.
- ✗ Niet kauwen op de tabletten.
- ✗ Tabletten niet pletten of breken.
- ✗ Geen pompelmoessap drinken, sterfruit of granaatappel eten, of Sint-janskruid gebruiken tijdens de behandeling
- ✗ Bij vergeten dosis: volgende dosis op het geplande tijdstip innemen. De vergeten dosis niet inhalen. Niet méér nemen dan voorgeschreven. Meld een vergeten dosis bij uw volgende opname aan uw arts.
- ✗ Bij braken vlak na de inname van Xeloda® of Tyverb® hoeft u uw dosis niet te herhalen. Neem de volgende dosis op het geplande tijdstip. Meld dat u heeft moeten braken.
- ✗ Bij accidentele inname door anderen → contacteer het antigifcentrum (070 245 245).
- ✗ Voor informatie en advies over de nevenwerkingen van deze behandeling: raadpleeg de ChemoWijzer of bespreek dit met uw arts of verpleegkundige.

Overzicht

Op het volgende overzicht kunt u aanvinken of u uw medicatie heeft genomen. Dit kan u helpen om de medicatie juist in te nemen.

Week 1

Datum		.. / / / / / / / ..
Dag		1	2	3	4	5	6	7
Ochtend	Xeloda®	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur
	Tyverb®	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur
Avond	Xeloda®	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur

Week 2

Datum		.. / / / / / / / ..
Dag		8	9	10	11	12	13	14
Ochtend	Xeloda®	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur
	Tyverb®	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur
Avond	Xeloda®	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur

Week 3

Datum		.. / / / / / / / ..
Dag		15	16	17	18	19	20	21
Ochtend	Tyverb®	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur

Geen Xeloda® tot uw volgende afspraak.

© oktober 2017 UZ Leuven. Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de dienst communicatie UZ Leuven. Ontwerp en realisatie: deze tekst werd opgesteld door het Leuvens kankerinstituut (LKI) in samenwerking met de dienst communicatie. www.chemotherapie.be
Verantwoordelijke uitgever UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven, tel. 016 33 22 11, www.uzleuven.be

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700219.

Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via communicatie@uzleuven.be.