



Nefrectomie: verwijdering van de nier

informatie voor patiënten

INLEIDING	4
NORMALE WERKING VAN DE NIEREN	5
OPERATIETECHNIEKEN	6
Open nefrectomie	
Lumbale nefrectomie	
Abdominale nefrectomie	
Kijkoperatie	
Laparoscopische of robotgeassisteerde nefrectomie	
VOOR DE OPERATIE	8
Onderzoeken	
Thuismedicatie	
OPNAME IN HET ZIEKENHUIS	10
Darmvoorbereiding	
De anesthesist	
Bloedverdunding	
De ochtend van de ingreep	
NA DE OPERATIE	11
Algemeen	
Blaassonde	
Maagsonde	
Veneuze katheter	
Leiding voor de pijntherapie	
Redon of Blake drain	
DAGELIJKS LEVEN	15
Voeding en stoelgang	
Relatie met kinderen en vrienden	
Beroep	
Vrije tijd	

RICHTLIJNEN BIJ ONTSLAG	17
Medicatie	
Zelf uw injectie toedienen	
Thuismedicatie	
Wondzorg	
Voorschriften en attesten	
MOGELIJKE PROBLEMEN NA ONTSLAG	20
OPVOLGING	21
INFORMATIE EN BEGELEIDING	22

U wordt in het ziekenhuis opgenomen voor een operatie waarbij één van de nieren wordt weggenomen.

In deze brochure vindt u informatie over de ingreep en uw verblijf in het ziekenhuis. De informatie geldt zowel voor patiënten die een open operatie ondergaan, als voor patiënten die een kijkoperatie (laparoscopische of robotgeassisteerde ingreep) ondergaan.

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen, aarzel dan niet om ze met uw huisarts, de artsen in het ziekenhuis, de (thuis)verpleegkundigen of de sociaal werker van de dienst urologie te bespreken. Samen kunnen we zoeken naar oplossingen voor concrete problemen.

Wij wensen u een spoedig herstel.



Het team van de dienst urologie

NORMALE WERKING VAN DE NIEREN

De nieren zijn twee boonvormige organen, gelegen aan weerszijden van de wervelkolom. Ze zorgen ervoor dat de schadelijke afvalstoffen uit het bloed gefilterd worden en dat overtollig water en zouten uit het lichaam verwijderd worden. De afvalstoffen en het overtollige water vormen samen de urine. Vanuit de nierbekkens loopt de urine via twee fijne buisjes – de urineleiders of ureters – naar de blaas.

Nieren en urinewegen, ligging t.o.v. middenrif en wervelkolom (links).

Nieren en urinewegen, ligging t.o.v. de buikorganen (rechts).



OPERATIETECHNIKEN

De nier kan verwijderd worden tijdens een open ingreep of tijdens een kijkoperatie (laparoscopisch/robotgeassisteerd).

De ingreep gebeurt altijd onder **volledige narcose**.

OPEN NEFRECTOMIE

X **Lumbale nefrectomie**

De nier wordt verwijderd via een insnede in de flank ter hoogte van de 11e of 12e rib. Er wordt meestal een epidurale pijnkatheter geplaatst (pijnpomp) om de pijn zoveel mogelijk te beperken. De katheter blijft gedurende een paar dagen zitten en de pomp kunt u zelf bedienen.

X **Abdominale nefrectomie**

De nier wordt verwijderd via een dwarse of overlangse insnede in de buik. Ook hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van een epidurale pijnkatheter (pijnpomp).

KIJKOPERATIE: LAPAROSCOPISCHE OF ROBOTGEASSISTEERDE NEFRECTOMIE

- De nier kan via een kijkoperatie worden verwijderd. De ingreep verloopt in dat geval **via enkele kleine gaatjes** in

plaats van via een grote snede. Meestal hebt u dan minder verdoving en pijnstillers nodig. Over het algemeen verloopt het herstel na een kijkoperatie sneller.

Er worden in totaal vier kleine insnedes gemaakt, waarlangs de camera en instrumenten naar binnen worden gebracht. Om de nier te kunnen verwijderen, wordt een van de openingen wat groter gemaakt.

- Soms gebeurt de ingreep robotgeassisteerd. Daarbij staat de chirurg niet zelf aan de operatietafel, maar zit hij enkele meters verder aan een apparaat waarmee hij de armen van de robot bedient en zo de ingreep uitvoert. De robot neemt zelf geen beslissingen en voert dus geen zelfstandige handelingen uit.

Het voordeel van een robot is dat het trillen van de handen wordt uitgeschakeld, terwijl de chirurg een driedimensionaal zicht heeft en de instrumenten de polsbewegingen imiteren.



VOOR DE OPERATIE

ONDERZOEKEN

Tijdens het spreekuur werd u uitgelegd dat deze operatie een goede voorbereiding vraagt. Er zijn dus een aantal onderzoeken en specifieke voorbereidingen nodig. Daarnaast wordt ook ingegaan op vragen en bekommernissen van u of uw partner.

Een aantal onderzoeken kunnen ambulantly gebeuren, dus tijdens een kort bezoek aan het ziekenhuis, voor u wordt opgenomen voor de ingreep:

- X Een bloed- en urineonderzoek
- X Screening op de ziekenhuisbacterie
- X Een bezoek aan de anesthesist op de preoperatieve raadpleging anesthesie. De anesthesist is de arts die de narcose of verdoving verzorgt.

Op die raadpleging gebeurt het volgende:

- invullen van een vragenlijst over uw medische voorgeschiedenis, medicatie, allergieën
- bespreken van de narcose en postoperatieve pijntherapie
- een hartonderzoek: ECG of electrocardiogram
- nemen van röntgenfoto's van de longen indien nodig

Daarnaast kunnen nog aanvullende onderzoeken plaatsvinden zoals een CT-scan, MRI-scan of PET-CT-scan.

De arts en de verpleegkundige die voor u verantwoordelijk zijn, zullen daarover bijkomende inlichtingen geven.

THUISMEDICATIE



Alle geneesmiddelen die u thuis nam, moet u verder innemen zoals voordien. Breng ze in een eigen doosje én in de originele verpakking mee bij uw opname.

Belangrijk is ook dat u alle geneesmiddelen volledig en correct doorgeeft aan de anesthesist (tijdens de preoperatieve raadpleging), met ook het tijdstip waarop u de medicatie inneemt.



Opgelet! Sommige geneesmiddelen die u neemt om uw bloed te verdunnen, kunnen het risico op bloeden tijdens de operatie vergroten. Die geneesmiddelen moet u stoppen volgens een bepaald schema. Tijdens de raadpleging zal de uroloog dat schema met u overlopen. Bespreek dit ook met uw huisarts!

OPNAME IN HET ZIEKENHUIS

DARMVOORBEREIDING

De dag voor de operatie worden de darmen gereinigd door het drinken van een aangepaste oplossing. Zodra de darmvoorbereiding is opgestart, mag u niets meer eten. U mag nog wel onbeperkt zwarte koffie, thee, frisdrank (cola, limonade), heldere vruchtensappen en water drinken (maar zeker **geen melk** of melkproducten).

DE ANESTHESIST

De anesthesist is de arts die instaat voor de verdoving. Meestal bent u al bij deze arts op controle geweest na de raadpleging op de dienst urologie. Als dat niet het geval is, komt de anesthesist de avond voor de ingreep nog bij u langs. Werd uw medicatie na de raadpleging op de dienst urologie nog gewijzigd, meld dit dan bij uw opname aan de verpleegkundige of de arts.

BLOEDVERDUNNING

De avond voor de ingreep krijgt u een onderhuidse inspuiting Clexane® of Fraxiparine® om klontervorming in het bloed (trombose en/of longembolie) te voorkomen. Die inspuiting zult u ook tot geruime tijd na de operatie dagelijks toegediend krijgen.

DE OCHTEND VAN DE INGREEP

Na middernacht mag u niet meer eten, drinken of roken. U wordt tijdig gewekt, zodat u een douche kunt nemen. De verpleeg-

kundige zal u een operatiehemd bezorgen. Vervolgens overloopt de verpleegkundige een controlelijst met specifieke informatie voor het operatiekwartier en krijgt u een kalmerend geneesmiddel als voorbereiding op de verdoving. Dan wordt u naar de operatiezaal gebracht.



NA DE OPERATIE

ALGEMEEN

- ✗ Na de operatie wordt gezorgd dat u geen pijn hebt. U moet zonder pijn kunnen ademen. Het is belangrijk dat u de eerste dagen na de ingreep een paar keer per uur diep in- en uitademt, om de longen goed te ventileren. Hebt u daarbij toch nog pijn, meld dit dan aan de verpleegkundige die u verzorgt.



Specifiek na een kijkoperatie kunt u kort na de ingreep schouderpijn hebben. Dat komt omdat de buik tijdens de ingreep gevuld wordt met CO₂-gas om een werkruimte te creëren. Op het einde van de ingreep wordt het gas weer verwijderd, maar er blijft altijd een beetje gas achter dat zich ophoopt onder het middenrif. Omwille van gedeeltelijk gemeenschappelijke zenuwen van het middenrif en de schoudertop, kan er daardoor pijn aan de schouder optreden na de ingreep.

- ✗ Dankzij een aangepaste pijntherapie (eventueel met een pijnpomp) kunt u de eerste dag na de ingreep al in de zetel zitten. Daarnaast is het belangrijk om beperkte bewegingsoefeningen te doen – zoals de voeten optrekken en de benen bewegen – om flebitis (ontsteking van de aders) en klontervorming in de aders van de onderste ledematen te voorkomen. Patiënten die een **laparoscopische/robotgeassisteerde ingreep** ondergaan, zullen ook speciale steunkousen moeten dragen om deze complicatie te voorkomen.
- ✗ De aanwezigheid van leidingen en buisjes kan hinderlijk zijn. Ze zijn echter noodzakelijk voor uw herstel en ze zijn maar tijdelijk. Wij geven u in deze brochure alvast een kort overzicht van de leidingen en buisjes.

BLAASSONDE

De blaassonde is de sonde die via de urinebuis in de blaas zit. De sonde wordt door de verpleegkundige verwijderd wanneer u voldoende mobiel bent om zelf naar het toilet te kunnen gaan. Meestal gebeurt dit vier tot vijf dagen na de ingreep.

Nadien zult u gedurende tien dagen tweemaal per dag capsules Urfadyn® (ontsmettingsmiddel voor de urine) moeten innemen.

MAAGSONDE

De maagsonde gaat via de neus tot in de maag om het maagvocht te laten aflopen. Darmrommelingen of een wind laten, geven aan dat de darmwerking opnieuw op gang komt. Wanneer de darmen weer normaal werken, wordt de maagsonde eerst afgeklemd en nadien verwijderd.

VENEUZE KATHETER (INFUUS)

De veneuze katheter is een leiding in de hals en/of in de arm. Deze leiding zorgt voor de vocht- en medicatietoediening. Gedurende twee à drie dagen krijgt u een suiker- of zoutoplossing toegediend. U kunt pas overschakelen op gewone voeding als uw darmen weer normaal werken. Dat is meestal na twee tot drie dagen.





LEIDING VOOR DE PIJNTHERAPIE

Het is mogelijk dat u een pijnpomp krijgt. Door middel van een pomp wordt dan medicatie toegediend die ervoor zorgt dat u pijnvrij blijft. Dat gebeurt ofwel via een epidurale leiding (rugverdooving), ofwel via een infuus. U kunt de pijnpomp zelf bedienen door een druk op een knopje, overdosering is niet mogelijk. Beide mogelijkheden worden voor de operatie door de anesthesist toegelicht.



Patiënten die een **laparoscopische/robotgeassisteerde ingreep** ondergaan, hebben geen pijnpomp nodig. Als het nodig is, wordt pijnstillende medicatie via een infuus toegediend. De leiding zal een drietal dagen blijven zitten. Na het verwijderen van de pijnpomp of het infuus kan, indien nodig, andere pijnmedicatie in de bilspier worden toegediend.

REDON OF BLAKE DRAIN

Om het overtollige wondvocht (bloed, lymfevocht enzovoort) uit de buik te verwijderen, wordt op het einde van de ingreep een drain geplaatst. Zodra het afvloeien van wondvocht stopt, kan de drain worden verwijderd door de verpleegkundige.

Bij een **laparoscopische nefrectomie** wordt er niet altijd een drain geplaatst.

DAGELIJKS LEVEN

VOEDING EN STOELGANG



De ingreep op zich heeft geen invloed op uw voedingsgewoonten. Toch is het belangrijk dat u zorgt voor een gezonde voeding met voldoende afwisseling. U moet er rekening mee houden dat uw stoelgangpatroon licht verstoord kan zijn na de operatie. Diarree is de meest voorkomende klacht. Dat is normaal, omdat er na de darmvoorbereiding vaak wat vloeistof in de darm achterblijft. De klachten over diarree verdwijnen na een tijdje. Als u last hebt van verstopping of harde stoelgang, kan de arts u geschikte medicatie voorschrijven. De darm neemt zijn normale werking vrij snel weer op. Als u toch problemen blijft onderhouden met uw stoelgang, waarschuw dan de arts of de verpleegkundige.

RELATIE MET FAMILIE EN VRIENDEN

Als u er zelf aan toe bent, kunt u met uw familie of vrienden praten over uw ingreep. Eerlijke en eenvoudige informatie voorkomt dat mensen uit uw directe omgeving allerlei onnodige vragen stellen of overdreven bezorgd reageren.

BEROEP

Als u voor de operatie werkte, kunt u nadien gerust uw beroep opnieuw uitoefenen. Zware lasten tillen of langdurig heffen vermijdt u echter het best tijdens de eerste zes weken na de ingreep.

Als uzelf, uw werkgever of uw verzekeringsinstelling eraan twijfelt of u kunt werken, bespreek dit dan met uw arts of met de sociaal werker. Zij zullen, mogelijk in samenspraak met andere hulpverleners, helpen zoeken naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.

VRIJE TIJD

- **Zware fysieke inspanningen** moet u de eerste zes weken vermijden.
- U kunt aan **recreatieve sport** doen, bijvoorbeeld fietsen, zwemmen of wandelen. U moet er wel op letten dat u het de eerste zes weken rustig aan doet. Luister naar uw lichaam.
- **Reizen** kunt u zonder problemen. U kunt wel beter geen koffers tillen.
- U mag zich rustig bezighouden met **tuinieren**. Wees echter voorzichtig en laat zeker het zware werk zoals spitten en heffen over aan anderen.



RICHTLIJNEN BIJ ONTSLAG

Na uw ontslag uit het ziekenhuis, moet u rekening houden met een aanpassingsperiode aan het dagelijkse leven. Denk eraan dat u het nog meerdere maanden rustig aan moet doen. Het herstel na zo'n ingreep heeft tijd nodig en wordt bevorderd door uw persoonlijke positieve instelling en die van uw omgeving.

MEDICATIE




- 1 Urfadyn® PL, 2x per dag gedurende 10 dagen (of een antibioticum)
- 2 Pijnstillers (indien nodig)
- 3 Ook thuis zal u eenmaal per dag een onderhuidse inspuiting Clexane® of Fraxiparine® moeten krijgen. U kunt die handeling eventueel zelf aanleren, zo niet zult u van de zaalarts een voorschrift voor thuisverpleging meekrijgen, samen met het medicatievoorschrift. In totaal moeten de inspuitingen worden verdergezet tot 30 dagen na de ingreep (= drie dozen Clexane® of Fraxiparine®).

ZELF UW INJECTIE TOEDIENEN

Waar?

De onderhuidse injectie moet toegediend worden tussen de huid en de onderliggende spier. De gemakkelijkste plaats is in de zijkanten van de buik. Spuit de ene dag links, de andere dag rechts. De beste plaats om de injectie toe te dienen, bevindt zich aan de zijkanten van de navel. Let wel op dat de huid proper is. U hoeft thuis de huid niet te ontsmetten.

Controleer of de dosis in de spuit overeenkomt met de voorgeschreven dosis. U hoeft geen lucht uit de spuit te verwijderen. Leg u op uw rug in een ontspannen houding.



Hoe?

Maak een huidplooi met de duim en de wijsvinger en houd ze vast. Steek de naald volledig en loodrecht in het dikste gedeelte van de plooi.

Houd de plooi vast gedurende de hele injectie. U hoeft de huid niet te reinigen na de injectie, probeer er ook niet op te drukken en maseer de huid zeker niet.



THUISMEDICATIE

De geneesmiddelen die u thuis gewoonlijk inneemt, moet u blijven gebruiken, met uitzondering van bloedverdunnende geneesmiddelen.

Als u thuis bloedverdunders nam, moet de inname van deze geneesmiddelen opnieuw gestart worden in overleg met de uroloog en uw huisarts.

WONDZORG

Voor uw ontslag uit het ziekenhuis wordt er een doorzichtig verband op de wonde aangebracht. Zo kan de huisarts of thuisverpleegkundige de wonde controleren. Het verband blijft ter plaatse tot tien dagen na de ingreep, wanneer de hechtingen verwijderd worden door de huisarts of thuisverpleegkundige.

Dagelijks een douche nemen is toegestaan, een bad nemen of zwemmen mag echter niet.



Bij een **laparoscopische/robotgeassisteerde ingreep** zijn er een aantal kleine wondjes waarvan de hechtingen meestal vanzelf oplossen na drie tot vier weken. U mag gerust douchen, maar baden of zwemmen wordt de eerste tien dagen afgeraden.

Zolang er nog wondvocht uit de wonde komt, is het verstandig om er een pleister of gaasje op te doen.

VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN

Voor u het ziekenhuis verlaat, moet u de volgende voorschriften hebben:

Medicatie: Clexane®/Fraxiparine® en Urfadyn® (of antibioticum)

Thuisverpleging: onderhuidse inspuitingen van Fraxiparine®/Clexane®

Ga voor uw ontslag na welke attesten door de uroloog of de dienst inschrijvingen moeten vervolledigd worden, bijvoorbeeld voor de hospitalisatieverzekering en voor het ziekenfonds, en het attest van werkonbekwaamheid.

MOGELIJKE PROBLEMEN NA ONTSLAG

- X Roodheid en/of vochtverlies ter hoogte van de wonde**
U neemt het best contact op met uw thuisverpleegkundige of huisarts.
- X Hematurie (bloed plassen)**
Extra drinken is aangewezen om de blaas en urinewegen goed te spoelen. Als u bloed blijft plassen, moet u contact opnemen met de uroloog.
- X Koorts**
Waarschuw uw huisarts, die kan bepalen of het probleem betrekking heeft op de ingreep of een andere oorzaak heeft.

OPVOLGING

De behandelende arts zal u na enkele weken laten terugkomen voor een controle op de raadpleging urologie. De datum wordt u op de dag van uw ontslag meegedeeld.

Indien van toepassing, wordt dan ook het resultaat van het microscopisch (anatomopathologisch) onderzoek met u besproken.

X Contact raadpleging urologie: tel. 016 34 66 85

X De verpleegeenheden:

- E 661: tel. 016 34 66 10
- E 429 (hospitalisatie vrouw C): tel. 016 34 59 80

X Het adres van de UZ Leuven-webtoepassing met patiënten-info op maat: www.mynexuzhealth.be

INFORMATIE EN BEGELEIDING

Hebt u nood aan begeleiding, dan kunt u terecht bij:

- **De sociaal werker of psycholoog van het ziekenhuis:**
 - ✗ Sociaal werkster Glenda Vandevelde, tel. 016 34 67 40
 - ✗ Psychologe Esther Vandebosch, tel. 016 34 76 84
- Via de **Stichting tegen Kanker** heeft u recht op gratis gesprekken met een psycholoog in uw buurt.
www.kanker.be
E-mail: leuven.vliga@tegenkanker.be
- **Een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in uw buurt:**
Maatschappelijke zetel
Kapucijnenvoer 35
3000 Leuven
Tel. 016 33 71 17
E-mail: vzw@cgg-vbo.be

© december 2019 UZ Leuven

Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie

Deze tekst werd opgesteld door de dienst urologie in samenwerking met de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700653.

Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via communicatie@uzleuven.be.

Verantwoordelijke uitgever
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
tel. 016 33 22 11
www.uzleuven.be

 mynexuzhealth



Raadpleeg uw medisch dossier
via www.mynexuzhealth.be
of download de app

