

Marcoumar® 3 mg (fenprocoumon) - Sintrom® 1/4 mg (acenocoumarol) - Marevan® 5 mg (warfarine) (= vitamine K-antagonisten = VKA)

MEDICATIE BIJ VOORKAMERFIBRILLATIE (VKF)



- ✓ VKA verdunnen het bloed en verkleinen het risico op het ontstaan van bloedklonters als gevolg van een hartritme-stoornis (voorkamerfibrillatie = VKF).
- ✓ VKA moeten meestal levenslang ingenomen worden. Vraag de duur van uw behandeling altijd na bij uw arts.
Stop nooit op eigen initiatief.
- ✓ VKA worden 1 keer per dag ingenomen, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip.
- ✓ De dosis hangt af van de dikte van het bloed, die via een bloedname vastgesteld wordt. De dosis kan van dag tot dag verschillen. Het bloed moet dus regelmatig gecontroleerd worden om de juiste dosis te bepalen.
- ✓ Dit geneesmiddel kan met of zonder voedsel ingenomen worden. Tabletten mogen geplet worden als slikken moeilijk is.

- ✓ Soms moet u dit geneesmiddel **tijdelijk** combineren met spuitjes die ook het bloed verdunnen.
- ✓ **Sla geen dosis over.**
- ✓ Als u een dosis vergeet, moet u deze zo snel mogelijk nog op de dag zelf innemen. **Neem nooit een dubbele dosis.**
- ✓ Een bloeding is de meest voorkomende bijwerking van een bloedverdunner. Het vermijden van een bloedklonter is echter meestal veel belangrijker dan het bloedingsrisico. Raadpleeg uw arts als u tekenen vertoont van bloedingen, zoals:

- ongewone blauwe plekken, neusbloedingen, bloeding van het tandvlees, snijwonden die langdurig bloeden
- bloederige fluimen of bloed braken
- rode of zwarte stoelgang, bloed in de stoelgang
- bloed in de urine
- duizeligheid, bleekheid of zwakte

- ✓ Start nooit met een ander geneesmiddel zonder uw arts te raadplegen, zelfs geen pijnstiller zonder voorschrift.
- ✓ Vermeld bij een bezoek aan de (huis)arts, apotheker, tandarts of in het ziekenhuis altijd dat u een bloedverdunner neemt.