

Je therapie: nal-irinotecan en 5FU

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS CHEMOTHERAPIE.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit twee verschillende celremmende geneesmiddelen: nanoliposomaal irinotecan en 5FU. Leucovorin is zelf geen cytostaticum, maar zorgt ervoor dat 5 FU beter werkt.

Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt twee weken (14 dagen) en omvat één opname voor chemotherapie. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe twee weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en je algemene toestand het toelaten.

Generieke naam	Merksnaam	Dag					Wijze van toediening
		1	2	3	4	5-14	
Nanoliposomaal Irinotecan	Onivyde®	•					Infuus over 90 minuten
Leucovorin	Elvorine®	•					Infuus over 30 minuten
5FU	Fluorouracil®	•	•	//			Infuus over 46 uur
Ondersteunende medicatie tegen misselijkheid							
	Acidexam® 10 mg	•					inspuiting
	Zofran® 8 mg	•					inspuiting
	Medrol® 32 mg		•	•	•		1 tablet via de mond
	Emend®	125 mg	80 mg	80 mg			1 capsule via de mond

WAAR WORDT DE THERAPIE TOEGEDIEND?

De behandeling kan in het dagziekenhuis gebeuren. Overnachting is dan niet nodig.

Je komt op dag 1 naar het ziekenhuis waar je nanoliposomaal irinotecan (gedurende 90 minuten) en leucovorin (gedurende 30 minuten) krijgt toegediend. Nadien krijg je 5FU gedurende 46 uur toegediend via een Infusor®-pompje waarmee je naar huis kan gaan. Dit pompje werkt dan gedurende 46 uur.

Op dag 3 zal de thuisverpleegkundige het Infusor®-pompje komen afschakelen of je kunt daarvoor naar het ziekenhuis komen.

AANDACHTSPUNTEN BIJ NANOLIPOSOMAAL IRINOTECAN - 5FU

- Als je 5FU via een Infusor®-pomp krijgt toegediend, is het belangrijk dat je voldoende (1,5 tot 2 liter per dag) drinkt tijdens de toediening.
- Gedurende de behandeling eet of drink je geen pompelmoes(sap), sterfruit of bloedappelsienen en gebruik je geen preparaten op basis van sint-janskruid (sint-janskruid bestaat onder andere in druppels en tabletten van A. Vogel).



NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie brochure)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:



~~Hand- en voetverzorging~~



~~Koude voeding en dranken vermijden~~



~~Nagelverzorging~~



Een alternatief (pruik, sjaaltje ...) voorzien



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie brochure)

Een verminderd aantal witte bloedcellen
Een verminderd aantal rode bloedcellen
Een verminderd aantal bloedplaatjes

Misselijkheid en braken
Smaak- en reukveranderingen
Mondslijmvliesontsteking (bv. aften)

Ongewone vermoeidheid
Invloed op de seksualiteit en intimiteit
Gevoelens van angst, boosheid en verdriet

Bij jouw behandeling kunnen zich ook de volgende nevenwerkingen voordoen:

- Buikloop of diarree
- ~~Verstopping~~
- Haarverlies *haarverdunning, mogelijk haarverlies*
- ~~Huidveranderingen~~
- ~~Handvoetsyndroom~~
- ~~Nagelveranderingen~~
- ~~Ooglast~~
- ~~Oorsuizingen en verminderd gehoor~~
- ~~Griepig gevoel~~
- ~~Tintelingen of voos gevoel in vingertoppen en/of tenen~~