

Je therapie: avelumab (Bavencio®)

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS BIJ JE BEHANDELING MET IMMUNOTHERAPIE.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel (immunotherapie), namelijk avelumab. Avelumab helpt je immuunsysteem om kankercellen beter te herkennen en aan te vallen. Daarnaast kunnen er andere geneesmiddelen voorgeschreven worden.

Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt twee weken (14 dagen) en omvat één dagopname voor immunotherapie. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe twee weken na dag 1, als de bloeuitslagen en je algemene toestand het toelaten.

Generieke naam	Merknaam	Dag		Wijze van toediening
		1	2-14	
avelumab	Bavencio®	•		Infuus over 1 uur
Ondersteunende medicatie Zyrtec® 10 mg Dafalgan® 1 gram		•		30 minuten voor de toediening Enkel bij de eerste 3 cycli, wanneer er zich geen problemen hebben voorgedaan.

WAAR WORDT DE THERAPIE TOEGEDIEND?

De behandeling kan in het dagziekenhuis gebeuren. Overnachting is niet nodig.

AANDACHTSPUNTEN BIJ AVELUMAB

- Een **infuusreactie** doet zich zelden voor. Als ze toch voorkomt, is dat meestal tijdens de eerste toediening terwijl je nog in het ziekenhuis bent. Een infuusreactie kenmerkt zich door huidsuitslag al dan niet in combinatie met jeuk (eventueel over heel het lichaam), een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Soms gaat een reactie gepaard met een gevoel van misselijkheid of met overmatig transpireren. Het is belangrijk dat je dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan de verpleegkundige of arts, zodat er vlug en adequaat kan worden gereageerd.



- Het is erg belangrijk dat een auto-immunreactie tijdig wordt vastgesteld en behandeld!

Neem daarom onmiddellijk contact op met je behandelende arts als je de volgende klachten ervaart:

 <p>Kortademigheid Hoesten</p>	 <p>Hoofdpijn Buikpijn Pijn ter hoogte van de lever (= rechts van de maagstreek) Pijnlijke of gezwollen gewrichten</p>	 <p>Extreme dorst</p>
 <p>Huiduitslag Jeuk Geel worden van de huid</p>	 <p>Vermoeidheid Lusteloosheid (Spier)zwakte Sufheid</p>	 <p>Veranderde stemming Gedepimeerd Sneller geïrriteerd Opvliegend zijn</p>
 <p>Geel worden van het oogwit Slecht zien</p>	 <p>Gewichtsverandering (zonder dat je eetpatroon is veranderd) Gewichtsverlies ondanks méér eetlust</p>	
 <p>Minder of net meer plassen Donkere urine Diarree of buikloop Bloed in de ontlasting</p>		



NEVENWERKINGEN OPVOLGEN, TIJDIG MELDEN EN BESPREKEN

Volg je klachten goed op, meld en bespreek ze tijdig met je zorgverleners. Je kan je **klachten opvolgen** aan de hand van een **papieren of elektronisch dagboek**. Je leest er meer over in de gids. Ervaar je ernstige of aanhoudende klachten of je bent ongerust over bepaalde klachten, aarzel dan niet je zorgverleners in het ziekenhuis of je huisarts te contacteren. 'Alarmsignalen' en **contactgegevens** vind je in de gids.



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (ZIE GIDS)

Bij jouw behandeling kunnen zich ook de volgende nevenwerkingen voordoen:

- Buikloop of diarree
- Huidveranderingen
- Ongewone vermoeidheid
- Misselijkheid, verminderde eetlust
- Invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet