

# Opvolgschema voor dragers van een BRIP1-mutatie



Wanneer u te maken krijgt met erfelijke borst-, eierstok- en eileiderkanker, moet u vaak moeilijke keuzes maken. Een van die keuzes kan zijn: welke medische voorzorgsmaatregelen kies ik in het geval van een ongunstig testresultaat?

Bij die beslissingen kunt u een beroep doen op professionele hulp. Het is belangrijk dat u goed geïnformeerd bent, zodat u uiteindelijk een eigen keuze maakt waar u achter kunt blijven staan.

## Risico's bij dragers van een BRIP1-mutatie

- Bij vrouwen is het risico op eileider- of eierstokkanker 5 tot 10%.
- Er is geen gekend verhoogd risico op borstkanker.

## VROUWEN

### Eierstok- en eileiderkanker

**Vóór 50 jaar:** preventieve operatie met wegnemen van eierstokken en eileiders (of vroeger, afhankelijk van de vroegste beginleeftijd van eierstok- of eileiderkanker in de familie).

### Borstkanker

Als geen borstkanker in de familie voorkomt, wordt screening volgens het bevolkingsschema geadviseerd:

**Vanaf 50 jaar:** mammografie 1x/2 jaar

## MANNEN

Er is geen specifieke opvolging nodig.