

Opvolgschema voor dragers van een RAD51C- of RAD51D-mutatie



Wanneer u te maken krijgt met erfelijke borst-, eierstok- en eileiderkanker, moet u vaak moeilijke keuzes maken. Een van die keuzes kan zijn: welke medische voorzorgsmaatregelen kies ik in het geval van een ongunstig testresultaat?

Bij die beslissingen kunt u een beroep doen op professionele hulp. Het is belangrijk dat u goed geïnformeerd bent, zodat u uiteindelijk een eigen keuze maakt waar u achter kunt blijven staan.

Risico's bij dragers van een RAD51C- of RAD51D-mutatie

- Bij vrouwen is het risico op eileider- of eierstokkanker 5 tot 10%.
- Er is een licht verhoogd risico op borstkanker (20 tot 25%). Dat risico is afhankelijk van het voorkomen van borstkanker in de familie.

VROUWEN

Eierstok- en eileiderkanker

Vóór 50 jaar: preventieve operatie met wegnemen van eierstokken en eileiders (of vroeger, afhankelijk van de vroegste beginleeftijd van eierstok- of eileiderkanker in de familie)

Borstkanker

Onderzoeken te beginnen vanaf 40 jaar, of ten minste 5 jaar vroeger dan het jongste aangetaste familielid.

40 - 75 jaar: jaarlijks mammografie + echografie

MANNEN

Er is geen gerichte opvolging nodig.