

Pradaxa® 75/110/150 mg (dabigatran)

BLOEDVERDUNNENDE MEDICATIE



- ✓ Pradaxa® verdunt het bloed en verkleint het risico op het ontstaan van nieuwe bloedklonters of lost bestaande bloedklonters op.
- ✓ De behandelduur met Pradaxa® is afhankelijk van de indicatie. Vraag de duur van uw behandeling altijd na bij uw arts. **Stop nooit op eigen initiatief.**
- ✓ Pradaxa® wordt 2 keer per dag ingenomen. Bij voorkeur 's ochtends en 's avonds, maar zeker elke dag op hetzelfde tijdstip.
- ✓ **Sla geen dosis over.**
Geen medicatie innemen = geen bescherming.

- ✓ Dit geneesmiddel kan best met voedsel ingenomen worden. De capsule mag niet geopend worden en u mag er niet op kauwen.
- ✓ Als u een dosis vergeet, moet u deze binnen de 6 uur na de geplande inname innemen. **Neem nooit een dubbele dosis.**
- ✓ Een bloeding is de meest voorkomende bijwerking van een bloedverdunner. Het vermijden van een bloedklonter is echter meestal veel belangrijker dan het bleedingsrisico. Raadpleeg uw arts als u tekenen vertoont van bloedingen, zoals:

- ongewone blauwe plekken, neusbloedingen, bloeding van het tandvles, snijwonden die langdurig bloeden
- bloederige fluimen of bloed braken
- rode of zwarte stoelgang, bloed in de stoelgang
- bloed in de urine
- duizeligheid, bleekheid of zwakte

- ✓ Start nooit met een ander geneesmiddel zonder uw arts te raadplegen, zelfs geen pijnstiller zonder voorschrift.
- ✓ Vermeld bij een bezoek aan de (huis)arts, apotheker, tandarts of in het ziekenhuis altijd dat u een bloedverdunner neemt.