

Je therapie: larotrectinib (Vitrakvi®)



DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS 'JE ONCOLOGISCHE BEHANDELING MET TABLETTEN OF CAPSULES'.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel (doelgerichte therapie), namelijk larotrectinib. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

- Je komt naar de raadpleging of het dagziekenhuis voor een bloedafname, een klinisch onderzoek en een voorraad capsules. Je neemt de capsules dan thuis in.
- Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. **Eén cyclus duurt 4 weken (28 dagen). Larotrectinib (Vitrakvi®) wordt dagelijks ingenomen.**
- Larotrectinib bestaat in siroop (20 mg/ml) of in capsules van 25 en 100 mg. Je arts of verpleegkundige vertelt je welke dosis je dagelijks moet nemen. Afhankelijk van de ernst van de nevenwerkingen die je ondervindt, is een dosisverlaging mogelijk.

Larotrectinib (Vitrakvi®) 2 x / dag		Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
..... mg larotrectinib 's morgens	 of 	✓	✓	✓	✓
..... mg larotrectinib 's avonds		✓	✓	✓	✓

Inname

- Larotrectinib wordt **tweemaal per dag** ingenomen met **12 uur tussen beide innames**.
- Larotrectinib wordt systematisch **op een lege maag of bij de maaltijd** ingenomen.
- **Interactie met voeding:** vermijd tijdens de inname van larotrectinib het eten of drinken van pompoes(sap), bittere appelsienen of preparaten op basis van sint-janskruid.

Wat als?

Als je een dosis **larotrectinib** bent vergeten, kan je **de vergeten dosis inhalen tot 6 uur vóór de volgende dosis**. Als er minder dan 6 uur is voor je volgende dosis, dan **sla je de vergeten dosis over**. Neem je volgende dosis op het geplande tijdstip.

Algemene richtlijnen rond de inname, bewaring, manipulatie en wat je het best doet als zich bepaalde situaties voordoen, kan je vinden in de gids 'Je oncologische behandeling met tabletten of capsules'.

AANDACHTSPUNTEN BIJ LAROTRECTINIB

- Mogelijk neemt je gewicht toe door de inname van larotrectinib.
- Larotrectinib kan slaperigheid en vermoeidheid veroorzaken, waardoor je reactievermogen vertraagd is. Wees daarom voorzichtig als je met de wagen rijdt.
- Larotrectinib kan een invloed hebben op de leverfunctie. Dat voel je meestal niet, maar je arts kan het in je bloed vaststellen.



NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie brochure)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en
mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven
medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook nog de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:



~~Bloeddruk meten~~



~~Hand- en
voetverzorging~~



~~Nagelbescherming~~



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN EN KLACHTEN AANPAKKEN (zie brochure)

Bij jouw behandeling kunnen zich de volgende nevenwerkingen of klachten voordoen:

- ~~Buikloop of diarree~~
- ~~Huidveranderingen zoals:~~
 - ~~Droge huid, schilfering, jeuk, huiduitslag~~
 - ~~Huiduitslag in de vorm van puistjes~~
 - ~~Huidveranderingen aan de handpalmen en voetzolen~~
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en reukveranderingen
- ~~Mondslimvliesontsteking (afters)~~
- Ongewone vermoeidheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Invloed op de seksualiteit
- Een verminderd aantal witte bloedcellen
- Een verminderd aantal rode bloedcellen
- Een verminderd aantal bloedplaatjes
- ~~Haarveranderingen~~
- ~~Nagelveranderingen~~
- Verstopping
- ~~Verhoogde bloeddruk~~
- ~~Tintelingen en voos-gevoel~~
- Spier- en gewrichtspijn