

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS BIJ JE ONCOLOGISCHE BEHANDELING MET TABLETTEN OF CAPSULES.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit een celremmend geneesmiddel, namelijk encorafenib. Deze doelgerichte therapie heeft invloed op bepaalde eiwitten die betrokken zijn bij de ontwikkeling en groei van kanker. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

- Encorafenib wordt gecombineerd met een andere celremmende therapie, namelijk cetuximab. Informatie over cetuximab vind je op een aparte bijlage.
- Je komt naar het dagziekenhuis voor een bloedafname, een klinisch onderzoek, een voorraad capsules en de toediening van cetuximab. Je neemt de capsules encorafenib dan thuis in.
- Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. **Eén cyclus duurt 3 weken (21 dagen). Encorafenib wordt dagelijks ingenomen.**
- Encorafenib bestaat in capsules van 50 mg en 75 mg. Je arts of verpleegkundige vertelt je welke dosis je dagelijks moet nemen. Afhankelijk van de ernst van de nevenwerkingen die je ondervindt, is een dosisverlaging mogelijk.

Encorafenib	Week 1	Week 2	Week 3
1x per dag mg encorafenib  of 	✓	✓	✓

Inname

- Encorafenib wordt **één keer per dag** ingenomen, **bij voorkeur 's morgens**.
- Encorafenib wordt best systematisch **op een lege maag of bij de maaltijd** ingenomen.
- **Interactie met voeding:** vermijd tijdens de inname van encorafenib het eten of drinken van pomelmoes(sap) of preparaten op basis van sint-janskruid.

Wat als?

Als je een dosis **encorafenib** bent vergeten, kan je **de vergeten dosis inhalen tot 12 uur vóór de volgende dosis**. Wanneer er minder dan 12 uur is vóór de volgende dosis, sla je de vergeten dosis over en neem je volgende dosis op het geplande tijdstip.

Algemene richtlijnen rond de inname, bewaring en manipulatie en wat je het best doet als zich bepaalde situaties voordoen, kan je vinden in de Gids bij je oncologische behandeling met tabletten of capsules.

AANDACHTSPUNTEN BIJ ENCORAFENIB

- Door de inname van encorafenib kan het gebeuren dat je last hebt van koorts, hoofd-, spier- en gewrichtspijn. Daarvoor mag je 1 gram paracetamol innemen, maximaal 4 keer per dag. Controleer je lichaamstemperatuur vóór de inname van paracetamol.

- Soms krijg je door de inname van deze medicijnen last van wazig zicht, droge of rode ogen of een ontsteking aan de ogen. Neem contact op met je behandelende arts als je dat ervaart.
- De medicijnen kunnen mogelijk een invloed hebben op de werking van je hart. Neem contact op met je behandelende arts als je pijn op de borstkas, hartkloppingen of kortademigheid ervaart.
- Door de inname van encorafenib is je huid heel gevoelig voor zonlicht, kan je snel verbranden en kan de huiduitslag door het zonlicht verergeren. Bescherm je daarom tegen zonlicht en probeer zoveel mogelijk direct en indirect zonlicht te vermijden.



NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie gids)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:



Bloeddruk meten



Hand- en voetverzorging



Nagelbescherming



NEVENWERKINGEN OPVOLGEN, TIJDIG MELDEN EN BESPREKEN

Volg je klachten goed op, meld en bespreek ze tijdig met je zorgverleners. Je kan je [klachten opvolgen](#) aan de hand van een [papieren of elektronisch dagboek](#). Je leest er meer over in de gids. Ervaar je ernstige of aanhoudende klachten of je bent ongerust over bepaalde klachten, aarzel dan niet je zorgverleners in het ziekenhuis of je huisarts te contacteren. 'Alarmsignalen' en [contactgegevens](#) vind je in de gids.



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie gids)

Bij jouw behandeling kunnen zich de volgende nevenwerkingen of klachten voordoen:

- Buikloop of diarree
- Huidveranderingen zoals:
 - Droge huid, schilfering, jeuk, huiduitslag
 - Huiduitslag in de vorm van puistjes
 - Huidveranderingen aan de handpalmen en voetzolen
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en reukveranderingen
- ~~Mondslimvliesontsteking (afters)~~
- ~~Een verminderd aantal witte bloedcellen~~
- Een verminderd aantal rode bloedcellen
- ~~Een verminderd aantal bloedplaatjes~~
- Haarveranderingen, *meestal haarverlies*
- ~~Nagelveranderingen~~
- Verstopping
- Verhoogde bloeddruk
- Tintelingen en voos gevoel
- Spier- en gewrichtspijn
- Ongewone vermoeidheid
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid