

Je therapie: BV-CHP (brentuximab, cyclofosfamide, doxorubicine, prednisolon)

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS CHEMOTHERAPIE.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit 3 verschillende celremmende geneesmiddelen: cyclofosfamide, doxorubicine (cytostatica) en brentuximab vedotin (doelgerichte therapie). Prednisolon is geen cytostaticum. Het is een corticoïdsteroid, maar maakt eveneens deel uit van de therapie. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE IN HET ZIEKENHUIS?

In dit schema wordt de chemotherapie gecombineerd met brentuximab vedotin. [Informatie daarover vind je op een aparte bijlage.](#)

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt 3 weken (21 dagen) en omvat één opname voor chemotherapie. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 3 weken na dag 1, als de bloeduitslagen en uw algemene toestand dit toelaten.

Generieke naam	Merknaam	Dag						Wijze van toediening
		1	2	3	4	5	6- 21	
Brentuximab vedotin	Adcetris®	•						Infuus over 30 minuten
Doxorubicine	Adriamycine®	•						Infuus over 30 minuten
Cyclofosfamide	Endoxan®	•						Infuus over 30 minuten
Prednisolon	Prednison®	•	•	•	•	•		Capsule innemen 's morgens bij het eten
Pegfilgastrim	Neulasta®		•					Onderhuidse inspuiting: 24 uur na de chemotherapie op dag 2

BELANG VAN ONDERSTEUNENDE MEDICATIE

- In dit schema maakt **prednisolon** deel uit van de therapie. Het is dan ook belangrijk dat je die medicatie zeker inneemt.
- Daarnaast krijg je nog andere medicijnen voorgeschreven die de nevenwerkingen van je therapie verminderen. Ook die medicatie is belangrijk.
- **Neulasta®** zorgt ervoor dat de witte bloedcellen zich sneller herstellen. Neulasta® wordt toegediend via een onderhuidse inspuiting en dit kan gebeuren door een thuisverpleegkundige. Je behandelende arts bezorgt je hiervoor een attest.

Ondersteunende medicatie	Dag					Inname
	1	2	3	4	5	
Zyloric® 300 mg	•	•	•	•	•	Tablet innemen na de maaltijd
Zofran Zydys® 8 mg	••					's Morgens en 's avonds op dag 1 van de cyclus, tablet innemen 30 minuten vóór de maaltijd. Zofran Zydys® voorzichtig openen, niet doordrukken en op de punt van de tong laten smelten.

WAAR WORDT DE THERAPIE TOEGEDIEND?

Je krijgt je therapie in het dagziekenhuis toegediend. Overnachting is dan niet nodig.

AANDACHTSPUNTEN BIJ BV-CHP

- De inname van corticosteroiden (namelijk prednisolon) kan bijwerkingen veroorzaken zoals maaglast, slaapmoeilijkheden, stemmingswisselingen en verhoogde eetlust. Toch is het belangrijk dat je deze

medicatie inneemt zoals het staat aangegeven of werd uitgelegd. De medicatie is immers belangrijk voor je behandeling. Bespreek deze klachten met je zorgverleners.

- Cyclofosfamide kan klachten geven die lijken op een blaasontsteking. Het is best voldoende te drinken (1,5 tot 2 liter per dag) tijdens en na de chemotherapietoediening, zodat alle schadelijke stoffen kunnen worden uitgeplast. Sowieso krijg je extra vocht toegediend via een infuus.
- Door doxorubicine is, tot enkele dagen na de therapie, **roodverkleuring** van de urine en soms het traanvocht mogelijk. Dit is volkomen onschuldig en verdwijnt spontaan.
- Doxorubicine kan schadelijk zijn voor je hart. Je arts zal regelmatig een hartfunctieonderzoek laten uitvoeren.



NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie brochure)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:



~~Hand- en voetverzorging~~



~~Koude voeding en dranken vermijden~~



~~Nagelverzorging~~



Een alternatief (pruik, sjaaltje ...) voorzien



NEVENWERKINGEN OPVOLGEN

Volg je klachten goed op, meld en bespreek ze tijdig met je zorgverleners. Op die manier kunnen we je zo goed mogelijk ondersteunen. Je leest er meer over in de gids chemotherapie.



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie brochure)

Bij jouw behandeling kunnen zich ook de volgende nevenwerkingen of klachten voordoen:

Een verminderd aantal witte bloedcellen
Een verminderd aantal rode bloedcellen
Een verminderd aantal bloedplaatjes

Misselijkheid en braken
Smaak- en geurveranderingen
Mondslimvliesontsteking (bv. aften)

Ongewone vermoeidheid
Invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid
Gevoelens van angst, boosheid en verdriet

- Buikloop of diarree
- Verstopping
- Haarverlies
- ~~Huidveranderingen~~
- ~~Handvoetsyndroom~~
- ~~Nagelveranderingen~~
- ~~Ooglast~~
- ~~Oorsuizingen en verminderd gehoor~~
- ~~Griepig gevoel~~
- Tintelingen of voos gevoel in vingertoppen en/of tenen