

Wat na een LLETZ-conisatie?

Informatie voor patiënten

In deze flyer leest u meer over de nazorg bij een LLETZ-conisatie.

BLOEDVERLIES

Na een LLETZ-conisatie kunt u nog tot drie weken bloedverlies hebben. Dit kan helderrood bloed zijn, maar ook bruin- of vochtverlies is mogelijk.

Vaak verliest u 7 tot 10 dagen na de ingreep plots meer bloed. Dit is normaal en komt door het genezingsproces. Elk bloedverlies, van weinig verlies tot de hoeveelheid van een hevige menstruatie, mag u als normaal beschouwen.

Contacteer het ziekenhuis op **tel. 016 34 08 03** bij buikpijn en/of hevig bloedverlies (meerdere maandverbanden per uur met verlies van klonters).

PIJN

De meeste vrouwen hebben achteraf weinig tot geen pijn. U mag paracetamol of ibuprofen innemen indien nodig.

WAT MAG NIET?

Na een LLETZ-conisatie raden we de volgende zaken af gedurende drie weken:

- seksueel contact,
- baden,
- zwemmen,
- het gebruik van tampons.

OP CONTROLE

Na de ingreep contacteert het contactcenter u om een nieuwe afspraak in te plannen, meestal na zes maanden. Als u bij uw eigen gynaecoloog wordt opgevolgd, dan dient u deze afspraak zelf te maken. Wanneer er eerder een onderzoek nodig is, zal de arts u contacteren. Als u de eerste dosis van het HPV-vaccin bij de ingreep kreeg, dan moet de tweede dosis 6 tot 8 weken later geplaatst worden. Die kan geplaatst worden door uw huisarts. Plan uw afspraak tijdig in. U kunt de derde en tevens laatste dosis van het HPV-vaccin krijgen bij de controle na zes maanden in het ziekenhuis of bij uw gynaecoloog.