

Je therapie: selpercatinib (Retsevmo[®]) (AMO - REO)

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS 'JE ONCOLOGISCHE BEHANDELING MET TABLETTEN OF CAPSULES'.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel (doelgerichte therapie), namelijk selpercatinib. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

- Je komt naar de raadpleging of het dagziekenhuis voor een bloedafname, een klinisch onderzoek en een voorraad capsules. Je neemt de capsules dan thuis in.
- Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. **Eén cyclus duurt 4 weken (28 dagen). Selpercatinib (Retsevmo[®]) wordt dagelijks ingenomen.**
- Selpercatinib bestaat in capsules van 40 en 80 mg. Je arts of verpleegkundige vertelt je welke dosis je dagelijks moet nemen. Afhankelijk van de ernst van de nevenwerkingen die je ondervindt, is een dosisverlaging mogelijk.



Om het effect van de behandeling op de bloedcellen na te gaan, wordt in cyclus 1 na 8 dagen een bloedafname aanbevolen. Tijdens de eerste 3 cycli wordt op dag 15 van elke cyclus eveneens een bloedafname aanbevolen. Dat gebeurt het best door de huisarts, net als de opvolging van de resultaten. Je kan hiervoor een laboformulier krijgen in het ziekenhuis. Op het formulier staat vermeld hoe de resultaten correct verstuurd kunnen worden naar UZ Leuven. Valt dag 15 op een vrijdag, gelieve dan een dag eerder naar de huisarts te gaan. Zo zijn de resultaten tijdig gekend voor de start van het weekend.

Selpercatinib (Retsevmo [®]) 2x/dag		Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
..... mg 's morgens	 of 	✓	✓	✓	✓
..... mg 's avonds		✓	✓	✓	✓

Inname

- Selpercatinib wordt **twee keer per dag** ingenomen.
- Selpercatinib wordt systematisch **op een lege maag of bij de maaltijd** ingenomen.
- **Interactie met voeding:** vermijd tijdens de inname van selpercatinib het eten of drinken van pompoes(sap), sterfruit, granaatappel of preparaten op basis van sint-janskruid.
- **Interactie met medicatie:** maagzuurremmers zoals Maalox[®] antacid, Rennie[®], Gaviscon[®], omeprazol, pantoprazol ... hebben een invloed op de werking van selpercatinib en op de wijze van inname. Neem je een maagzuurremmer type omeprazol of pantoprazol, dan neem je selpercatinib bij de maaltijd in. Bespreek het met je behandelende arts als je die medicijnen regelmatig gebruikt.

Wat als?

Als je een dosis selpercatinib bent vergeten, **sla dan de vergeten dosis over**. Neem je volgende dosis op het geplande tijdstip.

Algemene richtlijnen rond de inname, bewaring en manipulatie en wat je het best doet als zich bepaalde situaties voordoen, kan je vinden in de gids 'Je oncologische behandeling met tabletten of capsules'.

AANDACHTSPUNTEN BIJ SELPERCATINIB

- Door de inname van selpercatinib kan je last krijgen van hoofdpijn en/of buikpijn. Als je daar veel last van hebt, mag je tot maximaal 4 keer 1 gram paracetamol innemen tegen de pijn. Meet wel vooraf je lichaamstemperatuur om na te gaan of je geen koorts hebt. Bespreek deze klacht met je behandelende arts.
- Mogelijk krijg je door de inname van selpercatinib last van een droge mond.
- Als je reeds medicatie inneemt tegen hoge bloeddruk, kan je bloeddruk door de inname van selpercatinib nog verhogen.



NEVENWERKINGEN VOORKOMEN (zie brochure)

Bescherm jezelf tegen een aantal nevenwerkingen door:



Infecties voorkomen



Mondhygiëne en mondspoeling



Huidverzorging



Wondjes voorkomen



Rust en beweging



Voorgeschreven medicatie innemen



Voldoende drinken

Bij jouw behandeling zijn ook de volgende adviezen belangrijk om nevenwerkingen te voorkomen:



Bloeddruk meten



Hand- en voetverzorging



Nagelbescherming



NEVENWERKINGEN OPVOLGEN

Volg je klachten goed op, meld en bespreek ze tijdig met je zorgverleners. Op die manier kunnen we je zo goed mogelijk ondersteunen. Je kan je klachten opvolgen aan de hand van een papieren of elektronisch dagboek. Je leest er meer over in de 'Gids bij je oncologische behandeling met tabletten of capsules.'



MOGELIJKE NEVENWERKINGEN AANPAKKEN (zie brochure)

Bij jouw behandeling kunnen zich de volgende nevenwerkingen of klachten voordoen:

- Buikloop of diarree
- Een verminderd aantal witte bloedcellen
- Huidveranderingen zoals:
 - Droge huid, schilfering, jeuk, huiduitslag
 - ~~Huiduitslag in de vorm van puistjes~~
 - ~~Huidveranderingen aan de handpalmen en voetzolen~~
- Een verminderd aantal rode bloedcellen
- Een verminderd aantal bloedplaatjes
- Misselijkheid en braken
- Haarveranderingen *mogelijk haarverdünnung*
- Smaak- en geurveranderingen
- Nagelveranderingen
- Mondslijmvliesontsteking (afters) *vooral droge mond*
- Verstopping
- Verhoogde bloeddruk *mogelijk*
- Ongewone vermoeidheid
- ~~Tintelingen en voos-gevoel~~
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Spier- en gewrichtspijn
- Invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid